

# Bulletin Agrométéorologique Décadaire

N°08

Période du 11 au 20 Mars 2024



## SOMMAIRE


- hausse des températures extrêmes de l'air sous abri comparativement à la normale 1991-2020 sur la majeure partie du pays ;
- baisse des humidités relatives extrêmes de l'air sous abri par rapport à la normale 1991-2020, sur la majeure partie du territoire ;
- hausse de l'évapotranspiration potentielle (ETP) et de l'évaporation du bac classe « a » comparativement à la normale 1991-2020 sur la majeure du pays ;
- besoins en eau d'irrigation pour quelques cultures de saison sèche ;
- perspectives sur l'évolution de l'ETP climatique et de l'évolution du temps pour la prochaine décade ;
- suivi de l'évolution de la végétation par satellite.

## I. Situation climatologique

*La deuxième décennie de mars 2024 a été marquée par la présence d'une forte activité des vents d'harmattan sur la majeure partie du pays. Les températures maximales de l'air sous abri ont varié entre 39,1 °C à Orodara et 42,6 °C à Mani, tandis que les minimales ont oscillé entre 22,0 °C à Farakoba et 28,2 °C à Thiou-Koudougou. Les humidités relatives extrêmes de l'air sous abri ont évolué de 15 % à Gorom-Gorom à 83 % à Niangoloko pour les maximales et entre 5 % à Bogandé et 26 % à Bobo-Dioulasso pour les minimales. L'évapotranspiration potentielle (ETP) a oscillé entre 59 mm à Bérégadougou et 78 mm à Bogandé. L'évaporation bac classe « A » a varié entre 100 mm à Bérégadougou et 157 mm à Bogandé.*

### I.1. Evolution de la température

La deuxième décennie du mois de mars 2024 a été caractérisée par une évolution des températures maximales sous abri comprise entre 39,1 °C à Orodara dans la province du Kénédougou et 42,6 °C à Mani dans la Gnagna (fig. a). Comparativement à la normale (moyenne 1991-2020), pour la même période, elles ont été en hausse sur l'ensemble du pays (fig. b).




Les températures minimales de l'air sous abri ont varié entre 22,0 °C à Farakoba dans la province du Houet à 28,2 °C à Thiou-Koudougou dans le Boulkiemdé (fig. c). Par rapport à la

normale (moyenne 1991-2020) pour la même période, elles ont été en hausse sur la totalité du pays (fig. d).

## I.2. L'humidité relative de l'air

Au cours cette décade, l'humidité relative maximale de l'air sous abri a évolué entre 15 % à Gorom-Gorom dans la province de l'Oudalan et 83 % à Niangoloko dans la Comoé (fig. e). Comparativement à la normale (moyenne 1991-2020), elle a été en baisse sur la majeure partie du pays. Cependant, dans certaines localités des régions du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest, une hausse de ce paramètre a été constatée (fig. f).



Quant à l'humidité relative minimale sous abri, elle se situe entre 5 % à Bogandé dans la province de la Gnagna et 26 % à Bobo-Dioulasso dans le Houet (fig. g). Relativement à la normale (moyenne 1991-2020), elle a été en baisse sur la majeure partie du pays. Par contre,

une hausse de ce paramètre a été constatée dans certaines localités des régions du Nord, de l'Est, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest (fig. h).

## Conseils pratiques:

Au regard de l'évolution des températures moyennes minimales et maximales et des taux d'humidité relative de l'air, il est conseillé de poursuivre le séchage des produits de récolte pour réduire au maximum les pertes post récolte dues à certains déprédateurs.

Accélérer la mise en place des cultures maraîchères et des cultures de saison sèche pour permettre à celles-ci de boucler convenablement leur cycle.

Par rapport aux cultures pluviales, les cultures maraîchères ont des besoins spécifiques en eau et en température. Lorsque ces exigences ne sont pas remplies, les plants ont des difficultés de production ou la production est de mauvaise qualité. Compte tenu de ces contraintes, le choix de l'époque de cultures maraîchères est particulièrement déterminant. Le tableau suivant nous donne les exigences en eau et températures de quelques cultures maraîchères.

**Tableau I : exigence de quelques cultures maraîchères**

Cultures maraîchères	Besoins en eau	Températures favorables	
		20 - 30 °	30 - 40°
Pomme de terre	650 mm	++	+
Haricot vert	250 - 300mm	++	-
Tomate	700 - 750mm	++	+
Oignon	450 - 500 mm	++	+
Choux	650 mm	++	+
Carotte	400 - 500 mm	++	-

*Source : DUPRIEZ H 1987*

**Légende** : ++ : très favorable ; + : favorable ; - : défavorable

Ce tableau permet de voir qu'en dehors du haricot vert, toutes les autres cultures ont des besoins élevés en eau et préfèrent des températures douces pour leur croissance.

● **Attention!** Les températures extrêmes enregistrées dans les bas-fonds en cette période sont généralement inférieures de 1 à 2 °C à celles observées dans les stations.

- Il faut noter que la température optimale de croissance pour la plupart des variétés de **tomate** se situe entre 21 et 24 °C. Ces plantes peuvent supporter un certain intervalle de température, mais en dessous de 10 °C et au-dessus de 38 °C, les tissus des plantes seront endommagés. Leur température optimale de germination se situe entre 16 et 29 °C.
- L'avènement de températures extrêmes en cette période pourrait avoir aussi un effet néfaste sur la floraison, la pollinisation et la fructification des tomates et des poivrons. En effet, chez la tomate :
  - ❖ Une température supérieure à 35 °C entraîne une mise à fruit réduite ;
  - ❖ De 18.5 °C à 26.5 °C, on a une température optimale pour la mise à fruit ;
  - ❖ Par contre, une température inférieure à 13 °C occasionne le manque ou l'altération de la floraison.
- Pour ce qui concerne les poivrons :
  - ❖ Une température supérieure à 32 °C le jour entraîne une stérilité du pollen et une chute des fleurs ;
  - ❖ La température optimale pour la mise à fruits est de 16 °C ;
  - ❖ Par contre en dessous de 15.5 °C, on a une mise à fruits médiocre.
- ✚ **Le maïs** est très apte pour les températures de 20 à 25 °C, inapte aux températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 40 °C.
- ✚ La température des tubercules dans le sol pour **la pomme de terre**, idéalement, doit être inférieure à 15 °C.
- ✚ La température optimale de germination de **l'oignon** est de 18 °C.

Au regard de l'évolution des paramètres météorologiques ci-dessus, il est important de noter à l'endroit des producteurs que le **mildiou**, la plus redoutée et la plus célèbre des maladies de la tomate et de la pomme de terre se développe :

- ❖ Lorsque l'atmosphère est humide (système d'irrigation par aspersion mise à contribution) et que les températures sont douces à fraîches (comprises entre 17 et 27 °C) ;
- ❖ Qu'il se propage par le vent et s'agrippe aux feuilles mouillées. Aussi les pieds de tomates doivent être suffisamment espacés et aérés, afin de garder les feuilles les plus sèches, possible. Dans la mesure du possible, orienter les rangs parallèlement aux vents dominants afin de favoriser une meilleure circulation de l'air propice à l'assèchement du feuillage ;

- ❖ Qu'il peut survivre plusieurs années dans le sol ;
- ❖ Éviter d'arroser les plants le soir pour éviter que les feuilles restent humides toute la nuit ;
- ❖ Installer un système d'arrosage goutte à goutte.

### I.3. L'évaporation de l'eau


#### I.3.1 Situation de la décade

À la deuxième décade du mois de mars 2024, l'évapotranspiration potentielle (ETP) a oscillé entre 59 mm à Bérégadougou dans la province de la Comoé et 78 mm à Bogandé dans la Gnagna (fig. i). Relativement à la série 1991-2020 pour la même période, l'ETP a connu une hausse sur la totalité du pays (fig. j).

Quant à l'évaporation relevée dans le Bac classe « A », elle a été comprise entre 100 mm à Bérégadougou dans la Comoé et 157 mm à Bogandé dans la Gnagna (fig. k). Comparativement à la normale (moyenne 1991-2020), elle a été en hausse sur la majeure partie du pays. Cependant, une baisse de ce paramètre a été enregistrée dans certaines localités de la région de l'Est, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, du Centre, du Plateau-Central, de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins (fig. l).

Au regard de l'évolution des paramètres météorologiques ci-dessus analysés, nous conseillons aux producteurs d'observer les conditions optimales de pulvérisation des produits phytosanitaires qui sont les suivantes :

- ✚ Une hygrométrie comprise entre 60 % et 95 % ;
- ✚ Une vitesse de vent inférieure à 8 km/h (2.2 m/s) ;
- ✚ Une température inférieure à 21 °C ;
- **La pulvérisation de produits phytosanitaires à la température adéquate permet d'éviter leur évaporation ;**
- **Privilégier les pulvérisations en début ou en fin de journée qui sont des périodes pendant lesquelles le vent est calme et les températures sont basses ;**
- **Traiter avec une hygrométrie élevée (supérieure à 60 %) notamment lors de la mise en œuvre de produits systémiques appliqués sur le feuillage de préférence le matin ou le soir.**



- **Conseils** : compte tenu de la faible disponibilité des ressources en eau et évoluant dans un contexte de changement climatique, il est conseillé aux producteurs qui ont les moyens de songer à l'implantation des systèmes d'irrigation goutte à goutte. Cette technologie permet d'économiser l'eau à travers des goutteurs qui livrent l'eau à petite dose au pied de la culture mais sur un temps étalé.
- L'utilisation de résidus de récoltes pour le paillage du sol et la fumure organique est aussi fortement recommandée.

### I.3.2 Situation climatologique de l'évapotranspiration et de l'évaporation « bac »

**Tableau II** : Cumuls des valeurs de l'ETP et de l'évaporation Bac classe « A » du 1<sup>er</sup> Décembre au 31 Mars (normales 1991-2020)

stations	ETP (mm)	BAC (mm)
Bobo-Dioulasso	802,2	1272,8
Bogande	774,6	1516,2
Boromo	617,7	1140,1
Dedougou	814,1	1462,1
Dori	586,0	1045,9
Fada N'Gourma	693,0	1181,9
Gaoua	659,4	1066,6
Ouagadougou	762,2	1112,7
Ouahigouya	707,3	1305,7
Po	704,2	1212,0

### I.3.3 Besoins en eau d'irrigation

#### a. Coefficients culturaux de quelques cultures de saison sèche

Culture: Maïs Cycle: 125 jours Besoin en eau: 500 à 800 mm/ cycle

Stade de développement	G-DM (20 jrs)			M-AS (35 jrs)			DE-SGP (40 jrs)					MCG (30 jrs)		
Décade après semis/plantation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Coefficients culturaux	0.3	0.3	0.32	0.54	0.77	1	1.18	1.2	1.2	1.2	1.17	0.98	0.72	0.55

G : Germination AS : Apparition des Soies MCG : Maturité Complète des Grains  
DM : Début Montaison DE : Développement de l'Epi  
M : Montaison SGP : Stades Grain Pateux

Culture: Tomate Cycle: 135 jours Besoin en eau: 400 à 800 mm/cycle

Stade de développement	P - DC (30 jrs)			PC-DF (40 jrs)			DF-GF (40 jrs)				MF (25 jrs)			
Décade après semis/plantation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Coefficients culturaux	0.6	0.6	0.6	0.68	0.8	0.95	1.10	1.15	1.15	1.15	1.15	1.12	1.03	0.90

P : Plantation DF : Début Floraison

Culture: Oignon Cycle: 95 jours Besoin en eau: 350 à 550 mm/cycle

Stade de développement	G-B (20 jrs)		DDF (45 jrs)				FB (20 jrs)		MB (10 jrs)		
Décade après semis/plantation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Coefficients culturaux	0.7	0.7	0.77	0.89	1	1.05	1	1	1.05	1.01	0.96

G : Germination B : Bourgeonnement DDF : Développement des Feuilles  
FB : Formation de la Bulbe MB : Maturation de la bulbe

#### b. Evaluation des besoins en eau (en mm) maximaux (ETM) de quelques cultures de campagne sèche.

### Tableaux III : besoins en eau de quelques cultures



culture: Maïs		Cycle: 125 jours												
Stations	Décades	ETM (mm/décade) à partir du 1er jour après sémis												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bobo Dioulasso		22,4	22,4	23,9	40,3	57,4	74,6	89,5	89,5	89,5	87,2	73,1	53,7	41,0
Bogande		23,8	23,8	25,4	42,9	61,2	79,4	95,3	95,3	95,3	92,9	77,8	57,2	43,7
Boromo		19,4	19,4	20,7	35,0	49,9	64,8	77,8	77,8	77,8	75,8	63,5	46,7	35,6
Dédougou		23,8	23,8	25,4	42,8	61,1	79,3	95,2	95,2	95,2	92,8	77,7	57,1	43,6
Dori		18,7	18,7	20,0	33,7	48,1	62,4	74,9	74,9	74,9	73,1	61,2	45,0	34,3
Fada N'gourma		20,7	20,7	22,1	37,2	53,1	68,9	82,7	82,7	82,7	80,6	67,5	49,6	37,9
Gaoua		20,4	20,4	21,8	36,7	52,4	68,0	81,6	81,6	81,6	79,6	66,7	49,0	37,4
Ouagadougou		22,9	22,9	24,4	41,1	58,7	76,2	91,4	91,4	91,4	89,2	74,7	54,9	41,9
Ouahigouya		22,0	22,0	23,4	39,5	56,4	73,2	87,9	87,9	87,9	85,7	71,8	52,7	40,3
Pô		20,7	20,7	22,0	37,2	53,1	68,9	82,7	82,7	82,7	80,6	67,5	49,6	37,9

ETM = Kc\* ETo : Besoins en eau maximaux de la culture

culture: Tomate		Cycle: 135 jours													
Stations	Décades	ETM (mm/décade) à partir du 1er jour après plantation													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bobo Dioulasso		44,7	44,7	44,7	50,7	59,7	70,8	82,0	85,8	85,8	85,8	85,8	83,5	76,8	67,1
Bogande		47,7	47,7	47,7	54,0	63,5	75,5	87,4	91,3	91,3	91,3	91,3	89,0	81,8	71,5
Boromo		38,9	38,9	38,9	44,1	51,8	61,6	71,3	74,5	74,5	74,5	74,5	72,6	66,7	58,3
Dédougou		47,6	47,6	47,6	53,9	63,4	75,3	87,2	91,2	91,2	91,2	91,2	88,8	81,7	71,4
Dori		37,5	37,5	37,5	42,5	50,0	59,3	68,7	71,8	71,8	71,8	71,8	69,9	64,3	56,2
Fada N'gourma		41,3	41,3	41,3	46,9	55,1	65,5	75,8	79,2	79,2	79,2	79,2	77,2	71,0	62,0
Gaoua		40,8	40,8	40,8	46,3	54,4	64,6	74,8	78,2	78,2	78,2	78,2	76,2	70,1	61,2
Ouagadougou		45,7	45,7	45,7	51,8	61,0	72,4	83,8	87,6	87,6	87,6	87,6	85,3	78,5	68,6
Ouahigouya		43,9	43,9	43,9	49,8	58,6	69,6	80,6	84,2	84,2	84,2	84,2	82,0	75,4	65,9
Pô		41,3	41,3	41,3	46,9	55,1	65,5	75,8	79,2	79,2	79,2	79,2	77,2	71,0	62,0

ETM = Kc\* ETo : Besoins en eau maximaux de la culture

culture: Oignon		Cycle: 95 jours									
Stations	Décades	ETM (mm/décade) à partir du 1er jour après sémis									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bobo Dioulasso		52,2	52,2	57,4	66,4	74,6	78,3	78,3	78,3	75,3	71,6
Bogande		55,6	55,6	61,2	70,7	79,4	83,4	83,4	83,4	80,2	76,3
Boromo		45,4	45,4	49,9	57,7	64,8	68,0	68,0	68,0	65,4	62,2
Dédougou		55,5	55,5	61,1	70,6	79,3	83,3	83,3	83,3	80,1	76,1
Dori		43,7	43,7	48,1	55,6	62,4	65,6	65,6	65,6	63,1	59,9
Fada N'gourma		48,2	48,2	53,1	61,3	68,9	72,4	72,4	72,4	69,6	66,2
Gaoua		47,6	47,6	52,4	60,5	68,0	71,4	71,4	71,4	68,7	65,3
Ouagadougou		53,3	53,3	58,7	67,8	76,2	80,0	80,0	80,0	77,0	73,2
Ouahigouya		51,3	51,3	56,4	65,2	73,2	76,9	76,9	76,9	74,0	70,3
Pô		48,2	48,2	53,1	61,3	68,9	72,3	72,3	72,3	69,6	66,1

ETM = Kc\* ETo : Besoins en eau maximaux de la culture

**NB : les tableaux ci-dessus représentent les besoins en eau climatiques de chaque culture pour la deuxième décennie du mois de mars 2024 en fonction du stade dans lequel se trouve la culture.**

*Pour toute irrigation, tenir compte des caractéristiques des différents types de sols en présence*

### **Conseils-applications :**

- ✚ **Disposer du fumier qui est bien décomposé et qui n'est pas trop collant, ni trop humide ; il ne doit pas être trop sec non plus, car il peut s'avérer difficile de réhumidifier le fumier**
- ✚ **Mettre en place des brise-vents pour réduire l'assèchement des aménagements**
- ✚ **Espacer et adapter les quantités d'eau selon l'infiltration**
- ✚ **Optimiser l'arrosage :**
  - ✓ Biner, si possible, avant d'arroser ;
  - ✓ Arroser tôt le matin, ou en fin d'après-midi ;
  - ✓ Arroser au niveau des racines lorsque le sol est sec ;
  - ✓ Utiliser, en fonction des plantations, des techniques d'économie d'eau : « goutte à goutte », tuyaux poreux, paillages, etc.

### **Avantages du compost et du fumier**

Ils améliorent la fertilité et la structure du sol et réduisent la nécessité d'appliquer du phosphore (P), de l'azote (N) et du potassium (K). Ils fournissent une diversité d'éléments nutritifs à la culture et peuvent être préparés en 21/2 à 3 mois.


## **I.4. Suivi de la végétation**

### **Indice de végétation**

Le suivi de la végétation se base sur l'indice de végétation (NDVI-Normalized Difference Vegetation Index) à partir des données de télédétection. Cet indice de végétation exprime l'activité chlorophyllienne des végétaux et constitue ainsi une mesure de la quantité et de la vitalité de la végétation présente sur le sol dans une zone donnée. À la deuxième décennie du mois de mars 2024, la végétation présente une physionomie acceptable sur la majeure partie du pays excepté la zone sahélienne où l'on note une dégradation de la couverture végétative (fig. Ma).

Par rapport à la médiane historique (2012-2021), il est observé des conditions de croissance végétative en retard dans la majeure partie du territoire national. Cependant, des avancées de

croissance végétative sont observées dans certaines localités des régions du Sahel, du Nord, du Centre-Nord, des Hauts-Bassins et des Cascades (fig. Mb).




**Figure Ma :** Indice Normalisé Différentiel de Végétation à la 2<sup>ème</sup> décennie de mars 2024

**Figure Mb :** Anomalie de l'Indice Normalisé Différentiel de Végétation à la 2<sup>ème</sup> décennie de mars 2024

## I.5 Perspectives pour la troisième décennie du mois de mars 2024

### 1.5.1 Prévision climatologique de l'ETP

Il est attendu au cours de la troisième décennie du mois de mars 2024 que la demande climatique connaîtra une baisse sur l'ensemble du pays par rapport à la précédente décennie. Elle pourrait évoluer entre 62 mm à Dori et 79 mm à Bogandé (figure o).




**Figure o :** Prévision climatologique de l'ETP à la troisième décennie de mars 2024


### 1.5.2 Perspectives pour la période du 23 au 29 mars 2024

La période allant du 23 au 29 mars, sera marqué par de fortes remontées des flux humides de mousson sur la majeure partie du territoire. Toutefois, des incursions de vents d'harmattan seront observées sur les régions du Nord, du Sahel du Centre-nord et de l'Est avec une possible dégradation des visibilitées et la qualité de l'air dans lesdites localités vers la fin de période.


Le ciel sera partiellement nuageux. **Des manifestations pluvio-orageuses pourraient intéresser le pays surtout autour du 24 mars. Des cumuls pluviométriques hebdomadaires compris entre 2 mm et 20 mm sont attendus sur certaines localités des régions des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et du Centre-Sud (figure p).**

Les températures minimales oscilleront en moyenne entre **24°C** et **30°C** et les maximales moyennes varieront entre **36°C** et **43°C** (figures q et r). **La sensation de chaleur nocturne et matinale sera plus marquée par rapport à la période précédente.**





**Figure q :** Températures minimales moyennes prévues du 23 au 29 mars 2024 (Source NOAA GFS).



**Figure r :** Températures maximales moyennes prévues du 23 au 29 mars 2024 (Source NOAA GFS).

### Conseils-applications :

- ✓ Au regard des conditions météorologiques prévues pour les jours prochains, il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires pour se protéger contre la poussière afin d'éviter son inhalation. Si non, ceci pourrait occasionner les irritations de la peau et des yeux, la conjonctivite et les infections oculaires. Certaines maladies infectieuses sont transmises par la poussière.
- ✓ La poussière a aussi de nombreux effets néfastes sur l'agriculture car elle diminue les rendements en enfouissant les semis et les plantules, provoque une perte de tissu végétal, ralentit la photosynthèse et accentue l'érosion des sols. Il faudrait donc arroser les plants afin de les débarrasser des dépôts de poussière.
- ✓ Parmi les effets indirects des dépôts figurent aussi le colmatage des canaux d'irrigation, le recouvrement des voies de transport et la détérioration de la qualité de l'eau des barrages.
- ✓ La poussière a aussi une incidence sur la production des centrales solaires, en particulier sur les installations qui doivent recevoir un rayonnement direct. Les exploitants doivent veiller à ce que les particules ne s'accumulent pas sur les panneaux.
- ✓ **Les usagers des régions des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et du Centre-Sud doivent prendre les dispositions nécessaires pour se protéger et protéger leurs biens contre les intempéries.**