

Chủng ngừa cho trẻ sơ sinh

Hướng dẫn dành cho cha mẹ

Dưới đây là những loại vắc-xin mà con quý vị cần!

Khi sinh ^{1,2}	HepB	RSV-mAb ¹ 0-7 tháng													
2 tháng ^{1,2}	HepB 1-2 tháng ²	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	Bại liệt	+	RV				
4 tháng ^{1,2}	HepB ³	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	Bại liệt	+	RV				
6 tháng ^{1,2}	HepB 6-18 tháng ²	+	DTaP	+	PCV	+	Hib ⁴	+	Bại liệt 6-18 tháng ²	+	RV ⁵	+	Influenza (Cúm) ⁶	+	COVID ⁷
12 tháng tuổi trở lên ^{1,2}	MMR	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	Thủy đậu	+	HepA ⁸	+	Influenza (Cúm) ⁶		
	12-15 tháng ²		15-18 tháng ²		12-15 tháng ²		6-18 tháng ²		12-15 tháng ²		12-23 tháng ²				

Kiểm tra với bác sĩ hoặc y tá của quý vị để đảm bảo con quý vị được chích tất cả các loại vắc-xin đúng lịch. Trong nhiều trường hợp, các loại vắc-xin được kết hợp để giảm số lần chích. Hãy nhớ yêu cầu một thẻ ghi chép với ngày chủng ngừa của con quý vị; mang theo thẻ này mỗi lần thăm khám.

Dưới đây là danh sách các bệnh mà con quý vị sẽ được bảo vệ:

HepB: viêm gan B, một bệnh gan nghiêm trọng

DTaP: bạch hầu, uốn ván và ho gà

PCV: vắc-xin liên hợp phế cầu khuẩn bảo vệ chống lại một bệnh nhiễm trùng máu, phổi và não nghiêm trọng

Hib: *Haemophilus influenzae* loại b, một bệnh nhiễm trùng não, họng và máu nghiêm trọng

Bại liệt: bại liệt, một bệnh tê liệt nghiêm trọng

RSV: vi-rút hợp bào hô hấp, nhiễm trùng phổi nghiêm trọng

RV: nhiễm vi-rút rota, một bệnh tiêu chảy nghiêm trọng

Cúm: bệnh nhiễm trùng phổi nghiêm trọng

MMR: sởi, quai bị và rubella

COVID-19: một bệnh nghiêm trọng và có khả năng lây nhiễm cao

HepA: viêm gan A, một bệnh gan nghiêm trọng

Thủy đậu: còn được gọi là trái rạ

Lưu ý về bảng trên:

- Từ tháng 10 đến tháng 3, trẻ sơ sinh từ khi sinh đến 7 tháng tuổi có thể cần kháng thể phòng ngừa RSV (RSV-mAb) nếu không được tiêm vắc-xin RSV trong thời kỳ mang thai. Một số trẻ lớn hơn từ 8 đến 19 tháng tuổi có thể cần RSV-mAb trong mùa RSV thứ hai.
- Đây là độ tuổi nên chích vắc-xin này.
- Con quý vị có thể không cần chích vắc-xin HepB lúc 4 tháng tuổi, tùy theo loại vắc-xin được sử dụng. Hãy kiểm tra với bác sĩ hoặc y tá của quý vị.
- Con quý vị có thể không cần chích vắc-xin Hib lúc 6 tháng tuổi, tùy theo loại vắc-xin được sử dụng. Hãy kiểm tra với bác sĩ hoặc y tá của quý vị.
- Con quý vị có thể không cần chích vắc-xin RV lúc 6 tháng tuổi, tùy theo loại vắc-xin được sử dụng. Hãy kiểm tra với bác sĩ hoặc y tá của quý vị.
- Tất cả trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên cần được chích vắc-xin cúm vào mùa thu hoặc mùa đông hằng năm.
- Con quý vị sẽ cần chích 2 hoặc 3 liều, tùy theo nhãn hiệu vắc-xin ngừa COVID-19 được sử dụng.
- Con quý vị sẽ cần chích 2 liều vắc-xin HepA, cách nhau ít nhất 6 tháng.

