

婴儿免疫接种

家长指南

这些是您宝宝需要接种的疫苗！

出生时 ^{1,2}	乙肝 RSV-mAb ¹ 0-7个月
2个月 ^{1,2}	乙肝 1-2个月 ² + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV
4个月 ^{1,2}	乙肝 ³ + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV
6个月 ^{1,2}	乙肝 6-18个月 ² + DTaP + PCV + Hib ⁴ + Polio 6-18个月 ² + RV ⁵ + 流感 ⁶ + 新冠肺炎 ⁷
12个月及以上 ^{1,2}	MMR 12-15个月 ² + DTaP 15-18个月 ² + PCV 12-15个月 ² + Hib 6-18个月 ² + 水痘 12-15个月 ² + 甲肝 ⁸ 12-23个月 ² + 流感 ⁶

请与您的医生或护士核查，以确保您的宝宝按时接种了所有疫苗。大多数时候，疫苗可以合并，以减少注射次数。请务必索要一张记录卡，上面注明您宝宝接种疫苗的日期；每次就诊时请随身携带。

以下是您的宝宝将受到保护的疾病列表：

乙肝：乙型肝炎，一种严重的肝脏疾病

DTaP：白喉、破伤风（锁颞）和百日咳（哮喘）

PCV：肺炎球菌结合疫苗可预防严重的血液、肺部和脑部感染

Hib：乙型流感嗜血杆菌，一种严重的脑部、咽喉和血液感染

Polio：脊髓灰质炎/小儿麻痹症，一种严重的瘫痪性疾病

RSV：呼吸道合胞病毒，一种严重的肺部感染疾病

RV：轮状病毒感染，一种严重的腹泻疾病

流感：一种严重的肺部感染

MMR：麻疹、腮腺炎和风疹

新冠肺炎：一种严重的高度传染性疾病

甲肝：甲型肝炎，一种严重的肝脏疾病

水痘：也称为水痘-带状疱疹病毒

上图备注：

1. 从10月到次年3月，如果在怀孕期间没有接种RSV疫苗，新生儿到7个月大的婴儿可能需要RSV预防性抗体（RSV-mAb）。某些8-19月大的婴儿在第二个RSV流行季可能需要RSV-mAb。
2. 这是应接种这种疫苗的年龄范围。
3. 您的宝宝在4个月时可能不需要接种一剂乙肝疫苗，具体取决于所使用的疫苗。请咨询您的医生或护士。
4. 您的孩子在6个月时可能不需要接种一剂Hib疫苗，具体取决于所使用的疫苗。请咨询您的医生或护士。
5. 您的孩子在6个月时可能不需要接种一剂RV疫苗，具体取决于所使用的疫苗。请咨询您的医生或护士。
6. 所有6个月及以下的儿童应在每年的秋季或冬季接种流感疫苗。
7. 根据所接种的新冠肺炎疫苗品牌，您的孩子需要接种2或3剂新冠肺炎疫苗。
8. 您的孩子将需要接种2剂甲肝疫苗，间隔至少6个月。

