

아기를 위한 예방접종

부모님을 위한 가이드

아기에게 필요한 백신은 아래와 같습니다!

출생 시 ^{1,2}	HepB	RSV-mAb ¹ 0~7개월													
2개월 ^{1,2}	HepB 1~2개월 ²	+	DTaP	+	PCV	+	뇌수막염	+	소아마비	+	RV				
4개월 ^{1,2}	HepB ³	+	DTaP	+	PCV	+	뇌수막염	+	소아마비	+	RV				
6개월 ^{1,2}	HepB 6~18개월 ²	+	DTaP	+	PCV	+	뇌수막염 ⁴	+	소아마비 6~18개월 ²	+	RV ⁵	+	인플루엔자 ⁶	+	코로나 ⁷
12개월 이상 ^{1,2}	MMR 12~15개월 ²	+	DTaP 15~18개월 ²	+	PCV 12~15개월 ²	+	뇌수막염 6~18개월 ²	+	수두 12~15개월 ²	+	HepA ⁸ 12~23개월 ²	+	인플루엔자 ⁶		

귀하의 아기가 일정에 따라 모든 예방접종을 받고 있는지 담당 의사 또는 간호사와 확인하십시오. 주사 횟수를 줄이기 위해 백신을 함께 투여하는 경우가 많습니다. 아기의 백신 접종 날짜가 기재된 기록 카드를 요청해야 합니다. 매 방문 시 이를 지참하십시오.

다음은 귀하의 아기가 보호받아야 하는 질병의 목록입니다.

HepB: B형 간염, 심각한 간 질환

DTaP: 디프테리아, 파상풍(개구장애), 백일해(백일 기침)

PCV: 폐렴구균 결합 백신은 심각한 혈액, 폐 및 뇌 감염으로부터 보호함

뇌수막염(Hib): 헤모필루스 인플루엔자 b형, 중대한 뇌, 인후 및 혈액 감염

소아마비: 중대한 마비성 질환

RSV: 호흡기 세포융합 바이러스, 중대한 폐 감염

RV: 로타바이러스 감염, 심각한 설사 질환

인플루엔자: 중대한 폐 감염

MMR: 홍역, 볼거리, 풍진

코로나-19: 심각하고 전염성이 높은 질병

HepA: A형 간염, 중대한 간질환

수두: 바리셀라(varicella)고도 함

위의 차트에 대한 참고 사항:

- 10월부터 3월까지, 임신 기간 동안 RSV 백신을 접종하지 않은 경우, 생후 7개월까지 영아에게 RSV 예방적 항체(RSV-mAb)가 필요할 수 있습니다. 생후 8~19개월의 영아 중 일부는 두 번째 RSV철 동안 RSV-mAb가 필요할 수 있습니다.
- 이는 이 백신을 접종해야 하는 연령대입니다.
- 아기는 사용한 백신에 따라 생후 4개월에 Hep B 백신 접종을 받지 않아도 될 수 있습니다. 담당 의사 또는 간호사와 상의하십시오.
- 아기는 사용한 백신에 따라 생후 6개월에 뇌수막염 백신 접종을 받지 않아도 될 수 있습니다. 담당 의사 또는 간호사와 상의하십시오.
- 아기는 사용한 백신에 따라 생후 6개월에 RV 백신 접종을 받지 않아도 될 수 있습니다. 담당 의사 또는 간호사와 상의하십시오.
- 생후 6개월 이상의 모든 소아는 매년 가을 또는 겨울에 인플루엔자 백신 접종을 받아야 합니다.
- 자녀는 투여되는 코로나-19 백신의 브랜드에 따라 2회 또는 3회 접종을 받아야 합니다.
- 자녀는 최소 6개월 간격으로 HepA 백신을 2회 접종 받아야 합니다.

