

# Vaccination des bébés

## Un guide destiné aux parents

Voici les vaccins dont votre bébé a besoin !

À la naissance <sup>1,2</sup>	HépB	AcM-VRS <sup>1</sup> 0 à 7 mois									
2 mois <sup>1,2</sup>	HépB 1 à 2 mois <sup>2</sup>	+	DTCoq	+	PCV	+	Hib	+	Polio	+	RV
4 mois <sup>1,2</sup>	HépB <sup>3</sup>	+	DTCoq	+	PCV	+	Hib	+	Polio	+	RV
6 mois <sup>1,2</sup>	HépB 6 à 18 mois <sup>2</sup>	+	DTCoq	+	PCV	+	Hib <sup>4</sup>	+	Polio 6 à 18 mois <sup>2</sup>	+	RV <sup>5</sup> + Grippe <sup>6</sup> + COVID <sup>7</sup>
12 mois et plus <sup>1,2</sup>	ROR 12 à 15 mois <sup>2</sup>	+	DTCoq 15 à 18 mois <sup>2</sup>	+	PCV 12 à 15 mois <sup>2</sup>	+	Hib 6 à 18 mois <sup>2</sup>	+	Varicelle 12 à 15 mois <sup>2</sup>	+	HépA <sup>8</sup> 12 à 23 mois <sup>2</sup> + Grippe <sup>6</sup>

Consultez votre médecin ou votre infirmier/ère pour vous assurer que votre bébé reçoit toutes les vaccinations à temps. Souvent, les vaccins sont combinés pour réduire le nombre d'injections. N'oubliez pas de demander un carnet de santé avec les dates des vaccins de votre bébé et apportez-le à chaque visite.

Voici une liste des maladies contre lesquelles votre bébé sera protégé :

**HépB** : hépatite B, une maladie grave du foie

**DTCoq** : diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire

**PCV** : le vaccin conjugué contre le pneumocoque protège d'une infection grave du sang, des poumons et du cerveau

**Hib** : *Haemophilus influenzae* de type b, une infection grave du cerveau, de la gorge et du sang

**Polio** : poliomyélite, une maladie paralysante grave

**VRS** : virus respiratoire syncytial, une infection pulmonaire grave

**RV** : infection à rotavirus, une maladie diarrhéique grave

**Grippe** : une infection pulmonaire grave

**ROR** : rougeole, oreillons et rubéole

**COVID-19** : une maladie grave et hautement infectieuse

**HépA** : hépatite A, une maladie grave du foie

**Varicelle** : également appelée « petite vérole volante »

### Remarques sur le tableau ci-dessus :

1. D'octobre à mars, les nourrissons âgés de la naissance jusqu'à 7 mois peuvent avoir besoin d'anticorps préventifs contre le virus respiratoire syncytial (VRS ; AcM-VRS) si le vaccin contre le VRS n'a pas été administré pendant la grossesse. Certains nourrissons plus âgés, de 8 à 19 mois, peuvent avoir besoin d'AcM-VRS lors de leur deuxième saison de VRS.
2. C'est la tranche d'âge dans laquelle ce vaccin doit être administré.
3. Votre bébé n'a pas forcément besoin d'une dose de vaccin contre l'hépatite B à l'âge de 4 mois, en fonction du vaccin utilisé. Consultez votre médecin ou votre infirmier/ère.
4. Votre bébé n'a pas forcément besoin d'une dose de vaccin Hib à l'âge de 6 mois, en fonction du vaccin utilisé. Consultez votre médecin ou votre infirmier/ère.
5. Votre bébé n'a pas forcément besoin d'une dose de vaccin RV à l'âge de 6 mois, en fonction du vaccin utilisé. Consultez votre médecin ou votre infirmier/ère.
6. Tous les enfants âgés de 6 mois et plus devraient être vaccinés contre la grippe à l'automne ou à l'hiver de chaque année.
7. Votre enfant aura besoin de 2 ou 3 doses, selon la marque du vaccin contre la COVID-19 administré.
8. Votre enfant aura besoin de 2 doses de vaccin contre l'hépatite A, espacées d'au moins 6 mois.

