

Imunizacije za bebe

Vodič za roditelje

Ovo su vakcine koje su potrebne vašoj bebi!

Na rođenju ^{1,2}	Hep B	RSV-mAb ¹ 0-7 mjeseci																		
2 mjeseca ^{1,2}	Hep B 1-2 mjeseca ²	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	Polio	+	RV									
4 mjeseca ^{1,2}	Hep B ³	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	Polio	+	RV									
6 mjeseci ^{1,2}	Hep B 6-18 mjeseci ²	+	DTaP	+	PCV	+	Hib ⁴	+	Polio 6-18 mjeseci ²	+	RV ⁵	+	Grip ⁶	+	COVID ⁷					
12 mjeseci i stariji ^{1,2}	MMR 12-15 mjeseci ²	+	DTaP 15-18 mjeseci ²	+	PCV 12-15 mjeseci ²	+	Hib 6-18 mjeseci ²	+	Vodne kozice 12-15 mjeseci ²	+	Hep A ⁸ 12-23 mjeseci ²	+	Grip ⁶							

Provjerite sa svojim ljekarom ili medicinskom sestrom da li vaša beba prima sve vakcine u skladu sa ovim rasporedom. Mnogo puta se vakcine kombinuju da bi se smanjio broj injekcija. Obavezno zatražite karticu sa datumima vakcinacije vaše bebe; nosite ovo sa sobom na svaku posjetu.

Evo liste bolesti od kojih će vaša beba biti zaštićena:

HepB: hepatitis B, ozbiljno oboljenje jetre

DTaP: difterija, tetanus (čeljust) i hripavac (veliki kašalj)

PCV: pneumokokna konjugirana vakcina koja štiti od ozbiljne infekcije krvi, pluća i mozga

Hib: *Haemophilus influenzae* tip b, ozbiljna infekcija mozga, grla i krvi

Polio: dječja paraliza, teška paralizirajuća bolest

RSV: respiratorni sincicijski virus, ozbiljna infekcija pluća

RV: rotavirusna infekcija, ozbiljna bolest dijareje

Grip: ozbiljna infekcija pluća

MMR: boginje, zaušnjaci i rubeola

COVID-19: ozbiljna i visoko zarazna bolest

HepA: hepatitis A, ozbiljno oboljenje jetre

Vodne kozice: također se naziva varicela

Napomene za gornji grafikon:

1. Od oktobra do marta, novorođenčadi uzrasta od rođenja do 7 mjeseci možda će trebati RSV preventivna antitijela (RSV-mAb) ako RSV vakcina nije primljena tokom trudnoće. Određenoj starijoj novorođenčadi uzrasta od 8 do 19 mjeseci može biti potrebno RSV-mAb tokom njihove druge sezone RSV-a.
2. Ovo je starosna granica u kojoj se ova vakcina treba primiti.
3. Vašoj bebi možda neće trebati doza vakcine protiv Hep B u dobi od 4 mjeseca, u zavisnosti od vakcine koja se koristi. Provjerite sa svojim ljekarom ili medicinskom sestrom.
4. Vaša beba možda neće trebati dozu Hib vakcine u dobi od 6 mjeseci, ovisno o vakcini koja se koristi. Provjerite sa svojim ljekarom ili medicinskom sestrom.
5. Vašoj bebi možda neće trebati doza RV vakcine u dobi od 6 mjeseci, u zavisnosti od vakcine koja se koristi. Provjerite sa svojim ljekarom ili medicinskom sestrom.
6. Sva djeca uzrasta od 6 meseci i starija treba da se vakcinišu protiv gripa u jesen ili zimu svake godine.
7. Vašem djetetu će biti potrebne 2 ili 3 doze, u zavisnosti od marke vakcine protiv COVID-19 koja se daje.
8. Vašem djetetu će biti potrebne 2 doze vakcine protiv Hep A, u razmaku od najmanje 6 mjeseci.

Bosnian translation provided by Fargo Cass Public Health



FOR PROFESSIONALS www.immunize.org / FOR THE PUBLIC www.vaccineinformation.org

www.immunize.org/catg.d/p4010-bos.pdf
"Immunizations for Babies"
Item #P4010-bos Bosnian (12/8/2023)

Scan for PDF