

बच्चाहरूका लागि प्रतिरक्षण खोपहरू

आमाबुवाहरूका लागि मार्गदर्शक

यिनीहरू तपाईंको बच्चालाई आवश्यक पर्ने खोपहरू हुन्!

जन्ममा ^{1,2}	HepB	RSV-mAb ¹ 0-7 महिना									
2 महिना ^{1,2}	HepB 1-2 महिना ²	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	पोलियो	+	RV
4 महिना ^{1,2}	HepB ³	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	पोलियो	+	RV
6 महिना ^{1,2}	HepB 6-18 महिना ²	+	DTaP	+	PCV	+	Hib ⁴	+	पोलियो 6-18 महिना ²	+	RV ⁵ + इन्फ्लुएन्जा ⁶ + कोभिड ⁷
12 महिना र सोभन्दा बढी उमेरको ^{1,2}	MMR 12-15 महिना ²	+	DTaP 15-18 महिना ²	+	PCV 12-15 महिना ²	+	Hib 6-18 महिना ²	+	चिकनपक्स 12-15 महिना ²	+	HepA ⁸ 12-23 महिना ² + इन्फ्लुएन्जा ⁶

तपाईंको बच्चाले तालिकामा भएका सबै खोप लगाइरहनुभएको छ भनी सुनिश्चित गर्नका आफ्नो चिकित्सक वा नर्ससँग जाँच गर्नुहोस्। धेरै पटक खोपहरू इन्जेक्सनको संख्या कम गर्न संयुक्त हुन्छन्। तपाईंले आफ्नो बच्चाको खोपका मितिहरू सहितको रेकर्ड कार्ड अनुरोध गर्नुभएको छ; यसलाई प्रत्येक भिजिटमा ल्याउनुहोस्।

यहाँ तपाईंको बच्चाबाट सुरक्षित हुने रोगहरूको सूची छ:

HepB: हेपाटाइटिस B, गम्भीर कलेजो रोग

DTaP: डिप्थेरिया, टिटानस र पर्टुसिस (लहरे खोकी)

PCV: न्यूमोकोकल कन्जुगेट भ्याक्सिनले गम्भीर रगत, फोक्सो र मस्तिष्कको संक्रमणबाट बचाउँछ

Hib: हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जाटाइप बी, गम्भीर मस्तिष्क, घाँटी र रक्त संक्रमण

पोलियो: पोलियो, गम्भीर पक्षघाती रोग

RSV: श्वासप्रश्वासमा असर गर्ने भाइरस, गम्भीर फोक्सो संक्रमण

RV: रोटाभाइरस संक्रमण, गम्भीर पखाला रोग

इन्फ्लुएन्जा: गम्भीर फोक्सो संक्रमण

MMR: दादुरा, ठेउँला र रूबेला

कोभिड 19: एक गम्भीर र अत्यधिक संक्रामक रोग

HepA: हेपाटाइटिस ए, गम्भीर कलेजो रोग

चिकनपक्स: भेरिसेला पनि भनिन्छ

माथिको चार्टका नोटहरू:

- अक्टोबरदेखि मार्च सम्म, गर्भावस्थाको समयमा RSV खोप दिइएन भने 7 महिना सम्मका शिशुहरूलाई RSV रोकथाम एन्टिबडी (RSV-mAb) को आवश्यकता हुन सक्छ। 8 देखि 19 महिना सम्मका केही ठुला शिशुहरूलाई उनीहरूको दोस्रो RSV सिजनमा RSV-mAb आवश्यक पर्न सक्छ।
- यो खोप दिनुपर्ने उमेरको दायरा हो।
- प्रयोग गरिएको खोपको आधारमा तपाईंको बच्चालाई 4 महिनाको उमेरमा HepB खोपको डोज आवश्यक नहुन सक्छ। यसबारे आफ्नो चिकित्सक वा नर्ससँग जाँच गराउनुहोस्।
- प्रयोग गरिएको खोपको आधारमा तपाईंको बच्चालाई 6 महिनाको उमेरमा Hib खोपको डोज आवश्यक नहुन सक्छ। यसबारे आफ्नो चिकित्सक वा नर्ससँग जाँच गराउनुहोस्।
- प्रयोग गरिएको खोपको आधारमा तपाईंको बच्चालाई 6 महिनाको उमेरमा RV खोपको डोज आवश्यक नहुन सक्छ। यसबारे आफ्नो चिकित्सक वा नर्ससँग जाँच गराउनुहोस्।
- 6 महिना वा सोभन्दा माथिका सबै बालबालिकाले प्रत्येक वर्षको शरद वा जाडोमा इन्फ्लुएन्जा विरुद्धको खोप लगाउनुपर्छ।
- तपाईंको बच्चालाई दिइएको कोभिड-19 खोपको ब्रान्डको आधारमा 2 वा 3 डोजहरू चाहिन्छ।
- तपाईंको बच्चालाई कम्तीमा 6 महिनाको अन्तरमा दिइने HepA खोपको 2 डोज चाहिन्छ।

Nepali translation provided by Fargo Cass Public Health



FOR PROFESSIONALS www.immunize.org / FOR THE PUBLIC www.vaccineinformation.org

www.immunize.org/catg.d/p4010-nep.pdf

"Immunizations for Babies"

Item #P4010-nep Nepali (12/8/2023)



Scan for PDF