

د اطفالو لپاره د واکسينونو ترسره کول

د والدينو لپاره يو لارښود

دا هغه واکسينونه دي چې ستاسو اطفال ورته اړتيا لري!

د زېږون پرمهال ^{1,2}	تور زېږی	RSV-mAb ¹ 0-7 میاشتې
2 میاشتې ^{1,2}	تور زېږی ¹⁻² میاشتې ²	DTaP + PCV + Hib + پولیو + RV
4 میاشتې ^{1,2}	تور زېږی ³	DTaP + PCV + Hib + پولیو + RV
6 میاشتې ^{1,2}	تور زېږی ² 6-18 میاشتې ²	DTaP + PCV + Hib ⁴ + پولیو ² 6-18 میاشتې ² + RV ⁵ + انفلوینزا ⁶ + کووید ⁷
12 میاشتې او ډېر عمر ^{1,2}	MMR ² 12-15 میاشتې ²	DTaP ² 15-18 میاشتې ² + PCV ² 12-15 میاشتې ² + Hib ² 6-18 میاشتې ² + میانه ² 12-15 میاشتې ² + ژېږ زېږی ⁸ 12-23 میاشتې ² + انفلوینزا ⁸

له خپل ډاکټر یا نرس سره وگورئ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو ماشوم ټول واکسينونه په خپل وخت ترلاسه کوي. ډېری وختونه واکسين گډ او په ترکیبي بڼه کېږي ترڅو د ستونو شمېر راکم شي. د خپل ماشوم د واکسينو کارت غوښتنه هرو مرو وکړئ چې د شوي واکسينونو نېټې پکې لیکل شوي وي؛ دا هر ملاقات ته د ځان سره راوړئ.

لته د ناروغيو یو لیست دی چې د واکسينو په پایله کې به یې پروراندې ستاسو ماشوم خوندي وي:

RSV: د تنفسي سنسیشیال ویروس، د سږو شدید عفویت

RV: د روټاویروس عفونیت، د شدید نس ناستي ناروغي

انفلوینزا: د سږو شدید ناروغي

MMR: شری، ممپس، او رویلا

کووید 19: شدید او خورا ډېره عفوني ناروغي

ژېږ زېږی: هېپاټایټس ای، د خيگر شدید ناروغي

شری: وارسیلا هم ورته ویل کېږي

تور زېږی: تور زېږی، د ځيگر جدي ناروغي

DTaP: ديفټیریا، تیتانوس (د جامې کلکېدل)، او پیرټوسس (تور ټوخی)

PCV: د سینه بغل واکسين د وینې، سږو، او د مغز شدید عفونیت پر وړاندې خونديتوب وړاندې کوي

Hib: هایموفیلوس انفلوینزا نوع بی، د مغز، ستوني، او د وینې شدید عفونیت

پولیو: پولیو یا گوزن، د شدید گوزن ناروغي

د پورتنی جدول په اړه یادښتونه:

- د اکتوبر څخه تر مارچ پورې، اطفال د زېږون له عمر څخه تر 7 میاشتې پورې ښايي د RSV وځايوي انټي باډي (RSV-mAb) ته اړتیا ولري که چېرې د RSV واکسين د امېندواری پرمهال ترسره شوي نه وي. ځينې عمر لرونکي اطفال د 8 میاشتې څخه تر 19 میاشتې پورې ښايي RSV-mAb ته د هغوی د دوهم RSV موسم پرمهال اړتیا ولري.
- دا د عمر هغه حد دی چې دا واکسين باید پکې وشي.
- ستاسو ماشوم ښايي د کارول شويو واکسين په پام کې نیولو سره، په 4 میاشتې عمر کې د تور زېږي د واکسين یوه دوز ته اړتیا ونه لري. له خپل ډاکټر یا نرس سره وگورئ.
- ستاسو ماشوم ښايي د کارول شوي واکسينو په پام کې نیولو سره، په 6 میاشتې عمر کې د Hib واکسين یو دوز ته اړتیا ونه لري. له خپل ډاکټر یا نرس سره وگورئ.
- ستاسو ماشوم ممکن د کارول شوي واکسين په پام کې نیولو سره، په 6 میاشتې عمر کې د RV واکسين یو دوز ته اړتیا ونلري. له خپل ډاکټر یا نرس سره وگورئ.
- د 6 میاشتو او ډېر عمر لرونکي ټول ماشومان باید د هر کال مني یا ژمي کې د انفلوینزا پروراندې واکسين شي.
- د ورکول کېدونکي کووید 19 واکسين براند په پام کې نیولو سره، ستاسو ماشوم به 2 یا 3 دوزونو ته اړتیا ولري.
- ستاسو ماشوم به د ژېږ زېږي واکسين 2 دوزونو ته اړتیا ولري، چې لږترلږه د 6 میاشتو مهالني واټن په توپیر سره ورکول کېږي.



www.immunize.org/catg.d/p4010-pus.pdf

"Immunizations for Babies"

Item P4010-pus Pashto (12/8/2023)

Pashto translation provided by Fargo Cass Public Health



FOR PROFESSIONALS www.immunize.org / FOR THE PUBLIC www.vaccineinformation.org