

Vacunas para lactantes y niños, edades 0 a 10 años

Vacunar a su hijo a tiempo le ayudará a protegerse frente a 18 enfermedades que se pueden prevenir con la vacunación. Pregúntele al proveedor de atención médica de su hijo si está al día con todas las vacunas recomendadas.

Vacuna	¿Su hijo tiene las vacunas al día?
Varicela (Var)	Su hijo necesita 2 dosis de la vacuna contra la varicela. La primera dosis se administra de los 12 a 15 meses y la segunda de los 4 a los 6 años.
COVID-19	Todas las personas de 6 meses de edad o más necesitan la vacuna contra el COVID-19 de acuerdo con las recomendaciones actuales de los CDC. La vacuna previene las complicaciones raras pero graves del COVID-19 en niños.
Difteria, tétanos y tosferina (tos convulsa; DTaP)	Su hijo necesita 5 dosis de la vacuna DTaP. La primera dosis se administra a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses, la cuarta de los 15 a los 18 meses y la quinta de los 4 a los 6 años.
Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Su hijo necesita de 3 a 4 dosis de la vacuna Hib, dependiendo de la marca de la vacuna. La primera dosis se administra a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses (si es necesario) y la última de los 12 a los 15 meses.
Hepatitis A (HepA)	Su hijo necesita 2 dosis de la vacuna contra la hepatitis A. La primera dosis se administra a la edad de 1 año y la segunda entre 6 a 18 meses después.
Hepatitis B (HepB)	Su hijo necesita al menos 3 dosis de la vacuna contra la hepatitis B, dependiendo de la marca de la vacuna. La primera dosis se administra al nacer, la segunda a la edad de 1 o 2 meses y la última de los 6 a los 18 meses.
Virus del papiloma humano (VPH)	La vacuna contra el VPH se administra de forma rutinaria a niños a los 11 o 12 años, pero puede iniciarse a los 9 años. Esta serie de dos dosis debe estar separada por 6 a 12 meses.
Gripe (influenza)	Todas las personas de 6 meses de edad o más necesitan vacunarse contra la gripe cada otoño o invierno. Algunos niños menores de 9 años necesitan 2 dosis. Pregunte al proveedor de atención médica de su hijo si necesita más de 1 dosis esta temporada.
Sarampión, paperas, rubéola (MMR)	Su hijo necesita 2 dosis de la vacuna MMR. La primera dosis se administra de los 12 a los 15 meses y la segunda de los 4 a los 6 años.
Meningococo (MenACWY, MenB)	Los lactantes y niños de 0 a 10 años de edad con ciertas afecciones médicas (como un bazo no funcional) necesitan la vacuna MenACWY o, a los 10 años de edad, las vacunas MenACWY y MenB. Hable con su proveedor de atención médica para averiguar si su hijo necesita vacunación meningocócica.
Neumocócica (vacuna conjugada [PCV]; vacuna de polisacáridos, [PPSV23])	Su hijo necesita 4 dosis de la vacuna conjugada (PCV). La primera dosis se administra a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses y la cuarta de los 12 a los 15 meses. Algunos niños mayores con ciertas afecciones médicas también necesitan vacunas antineumocócicas adicionales. Pregúntele al proveedor de atención médica de su hijo si necesita esta protección adicional contra la enfermedad neumocócica.
Poliomielitis (VPI)	Su hijo necesita 4 dosis de la vacuna contra la poliomielitis (VPI) para protegerlo de la poliomielitis paralítica. La primera dosis se administra a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera de los 6 a los 18 meses y la cuarta de los 4 a los 6 años.
Anticuerpo preventivo contra el Virus respiratorio sincitial (VRS-AcM)	De octubre a marzo, los lactantes desde el nacimiento hasta los 7 meses de edad pueden necesitar anticuerpos preventivos contra el VRS (VRS-AcM) si no se administró la vacuna contra el VRS durante el embarazo. Ciertos niños entre los 8 y 19 meses de edad con alto riesgo pueden necesitar VRS-AcM durante su segunda temporada de VRS.
Rotavirus (RV)	Su hijo necesita 2 o 3 dosis de la vacuna contra el rotavirus (RV), dependiendo de la marca de la vacuna. La primera dosis se administra a los 2 meses, la segunda a los 4 meses y la tercera (si es necesario) a los 6 meses.

¿Va a viajar su hijo fuera de los Estados Unidos? Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) en www.cdc.gov/travel/destinations/list para obtener información sobre desplazamientos, o consulte a una clínica de viajes.

