

Chủng Ngừa cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ 0–10 Tuổi

Cho trẻ chủng ngừa kịp thời sẽ giúp bảo vệ trẻ chống lại 18 loại bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin. Hãy hỏi bác sĩ của con quý vị xem bé đã được chủng ngừa đầy đủ các liều vắc-xin theo khuyến cáo hay chưa.

| Vắc-xin | Con quý vị đã chủng ngừa đầy đủ chưa? |
|--|---|
| Thủy đậu (varicella; Var) | Con quý vị cần 2 liều vắc-xin ngừa thủy đậu. Liều thứ nhất khi trẻ được 12–15 tháng tuổi và liều thứ hai khi trẻ được 4–6 tuổi. |
| COVID-19 | Tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên đều cần vắc-xin phòng COVID-19 theo các khuyến nghị hiện hành của CDC. Vắc-xin này ngăn ngừa các biến chứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng của COVID-19 ở trẻ em. |
| Uốn ván, bạch hầu và ho gà (pertussis; DTaP) | Con quý vị cần 5 liều vắc-xin ngừa DTaP (uốn ván, ho gà và bạch hầu). Liều thứ nhất khi trẻ được 2 tháng tuổi, liều thứ hai khi trẻ được 4 tháng tuổi, liều thứ ba khi trẻ 6 tháng tuổi, liều thứ tư khi trẻ được 15–18 tháng tuổi và liều thứ năm khi trẻ được 4–6 tuổi. |
| Viêm màng não mủ do Haemophilus influenzae tuýp b (Hib) | Con quý vị cần 3–4 liều vắc-xin ngừa Hib, tùy theo loại vắc-xin. Liều thứ nhất khi trẻ được 2 tháng tuổi, liều thứ hai khi trẻ được 4 tháng tuổi, liều thứ ba khi trẻ 6 tháng tuổi (nếu cần thiết), và liều cuối cùng khi trẻ được 12–15 tháng tuổi. |
| Viêm gan A (HepA) | Con quý vị cần 2 liều vắc-xin ngừa viêm gan A. Liều thứ nhất khi trẻ được 1 tuổi và liều thứ hai là sau 6–18 tháng. |
| Viêm gan B (HepB) | Con quý vị cần ít nhất 3 liều vắc-xin ngừa Viêm gan B, tùy theo loại vắc-xin. Liều đầu tiên được tiêm khi sinh, liều thứ hai lúc 1–2 tháng và liều cuối cùng lúc 6–18 tháng. |
| Vi-rút papilloma ở người (HPV) | Vắc-xin HPV được chích thường quy ở tuổi 11 hoặc 12 nhưng có thể bắt đầu ở 9 tuổi. Liệu trình hai liều này cần được tách biệt 6–12 tháng. |
| Influenza (Cúm) | Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên cần được chủng ngừa vào mỗi mùa thu hoặc mùa đông. Một số trẻ dưới 9 tuổi cần chích 2 liều. Hãy hỏi bác sĩ của con quý vị xem liệu bé có cần nhiều hơn 1 liều vắc-xin trong mùa này không. |
| Sởi, quai bị, rubella (MMR) | Con quý vị cần 2 liều vắc-xin MMR. Liều thứ nhất khi trẻ được 12–15 tháng tuổi và liều thứ hai khi trẻ được 4–6 tuổi. |
| Viêm màng não cầu khuẩn (MenACWY, MenB) | Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 0–10 tuổi đang mắc một số bệnh nhất định (ví dụ như chức năng lá lách không còn hoạt động) cần vắc-xin MenACWY hoặc, nếu 10 tuổi, vắc-xin MenACWY và MenB. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ xem con của quý vị có cần chủng ngừa viêm màng não cầu khuẩn hay không. |
| Phế cầu khuẩn (vắc-xin liên hợp [PCV]; vắc-xin polysaccharide [PPSV23]) | Con quý vị cần 4 liều vắc-xin liên hợp (PCV). Liều thứ nhất khi trẻ được 2 tháng tuổi, liều thứ hai khi trẻ được 4 tháng tuổi, liều thứ ba khi trẻ được 6 tháng tuổi và liều thứ tư khi trẻ được 12–15 tháng tuổi. Một số trẻ lớn hơn có một số tình trạng sức khỏe nhất định cũng cần tiêm chủng vắc-xin phế cầu khuẩn bổ sung. Hãy hỏi bác sĩ của con quý vị xem bé có cần chích bổ sung mũi ngừa bệnh phế cầu khuẩn này không. |
| Bại liệt (IPV) | Con quý vị cần 4 liều vắc-xin bại liệt (IPV) để bảo vệ trẻ khỏi bại liệt. Liều thứ nhất khi trẻ được 2 tháng tuổi, liều thứ hai khi trẻ được 4 tháng tuổi, liều thứ ba khi trẻ được 6–18 tháng, và liều thứ tư khi trẻ được 4–6 tuổi. |
| Kháng thể phòng ngừa vi-rút hợp bào hô hấp (Respiratory Syncytial Virus, RSV) (RSV-mAb) | Từ tháng 10 đến tháng 3, trẻ sơ sinh tới 7 tháng tuổi có thể cần kháng thể phòng ngừa RSV (RSV-mAb) nếu vắc-xin RSV không được tiêm trong thời kỳ mang thai. Một số trẻ lớn hơn từ 8 đến 19 tháng tuổi có nguy cơ cao có thể cần RSV-mAb trong mùa RSV thứ hai. |
| Vi-rút rota (RV) | Con quý vị cần 2–3 liều vắc-xin ngừa vi-rút rota (RV), tùy theo loại vắc-xin. Liều thứ nhất khi trẻ được 2 tháng tuổi, liều thứ hai khi trẻ được 4 tháng tuổi, liều thứ ba khi trẻ 6 tháng tuổi (nếu cần thiết). |

Sắp tới con của quý vị có đi du lịch bên ngoài nước Mỹ không? Vui lòng truy cập trang web của Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh) tại địa chỉ wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list để biết thông tin khi đi du lịch hoặc tư vấn một phòng khám về du lịch.

