

Vaccinations des nourrissons et des enfants âgés de 0 à 10 ans

La vaccination à temps de votre enfant aidera à le protéger de 18 maladies évitables en se vaccinant. Demandez au professionnel de santé de votre enfant si votre enfant est à jour pour tous les vaccins recommandés.

Vaccin	Votre enfant est-il à jour ?
Varicelle (varicelle, Var)	Votre enfant a besoin de recevoir 2 doses de vaccin contre la varicelle. La première dose est administrée entre 12 et 15 mois, et la seconde entre 4 et 6 ans.
COVID-19	Tous les patients âgés de 6 mois et plus ont besoin d'être vaccinés contre la COVID-19 conformément aux recommandations actuelles du CDC. Le vaccin prévient les complications rares mais graves de la COVID-19 chez les enfants.
Diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire (coqueluche ; DTCoq)	Votre enfant a besoin de recevoir 5 doses de vaccin DTCoq. La première dose est administrée à 2 mois, la deuxième à 4 mois, la troisième à 6 mois, la quatrième entre 15 et 18 mois, et la cinquième entre 4 et 6 ans.
Haemophilus influenza de type b (Hib)	Votre enfant a besoin de recevoir 3 à 4 doses de vaccin contre le Hib, selon la marque du vaccin. La première dose est administrée à 2 mois, la deuxième à 4 mois, la troisième à 6 mois (si nécessaire), et la dernière entre 12 et 15 mois.
Hépatite A (HépA)	Votre enfant a besoin de recevoir 2 doses de vaccin contre l'hépatite A. La première dose est administrée à l'âge de 1 an et la seconde 6 à 18 mois plus tard.
Hépatite B (HépB)	Votre enfant a besoin de recevoir 3 doses de vaccin contre l'hépatite B, selon la marque du vaccin. La première dose est administrée à la naissance, la deuxième entre 1 et 2 mois et la dernière dose entre 6 et 18 mois.
Papillomavirus humain (PVH)	Le vaccin PVH est administré systématiquement à l'âge de 11 ou 12 ans, mais peut commencer à être administré dès l'âge de 9 ans. Les doses de cette série doivent être espacées de 6 à 12 mois.
Grippe (Influenza)	Toutes les personnes âgées de 6 mois et plus doivent se faire vacciner contre la grippe chaque automne ou chaque hiver. Certains enfants de moins de 9 ans ont besoin de recevoir 2 doses. Demandez au professionnel de santé de votre enfant si votre enfant a besoin de recevoir plusieurs doses cette saison.
Rougeole, oreillons et rubéole (ROR)	Votre enfant a besoin de recevoir 2 doses de vaccin ROR. La première dose est administrée entre 12 et 15 mois, et la seconde entre 4 et 6 ans.
Méningococcie (MenACWY, MenB)	Les nourrissons et les enfants âgés de 0 à 10 ans présentant certaines pathologies (comme une rate non fonctionnelle) ont besoin de recevoir le vaccin MenACWY, ou, s'ils ont plus de 10 ans, les vaccins MenACWY et MenB. Discutez avec votre professionnel de santé pour savoir si votre enfant doit recevoir un vaccin méningococcie.
Pneumocoque (vaccin conjugué [PCV] ; vaccin polysaccharide [PPSV23])	Votre enfant a besoin de 4 doses de vaccin conjugué (PCV). La première dose est administrée à 2 mois, la deuxième à 4 mois, la troisième à 6 mois et la quatrième entre 12 et 15 mois. Certains enfants plus âgés atteints de certaines affections ont également besoin d'une vaccination contre le pneumocoque supplémentaire. Demandez au professionnel de santé de votre enfant si votre enfant a besoin de recevoir cette protection supplémentaire contre la maladie à pneumocoque.
Polio (VPI)	Votre enfant a besoin de 4 doses de vaccin contre la poliomyélite (VPI) pour le protéger de la poliomyélite paralytique. La première dose est administrée à 2 mois, la deuxième à 4 mois, la troisième entre 6 et 18 mois, et la quatrième entre 4 et 6 ans.
Anticorps préventif contre le virus respiratoire syncytial (AcM-VRS)	D'octobre à mars, les enfants nés avant l'âge de 7 mois peuvent avoir besoin d'anticorps préventifs anti-VRS (AcM-VRS) si le vaccin contre le VRS n'a pas été administré pendant la grossesse. Certains nourrissons âgés de 8 à 19 mois à haut risque peuvent avoir besoin d'AcM-VRS lors de leur deuxième saison de VRS.
Rotavirus (RV)	Votre enfant a besoin de recevoir 2 à 3 doses de vaccin contre le rotavirus (RV), selon la marque du vaccin. La première dose est administrée à 2 mois, la deuxième à 4 mois, et la troisième (si nécessaire) à 6 mois.

Votre enfant va-t-il voyager en dehors des États-Unis ? Visitez le site web des Centres de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) à l'adresse wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list pour obtenir des informations destinées aux voyageurs, ou adressez-vous à une clinique de médecine des voyages.

