

اللقاحات للرضع والأطفال، عند عمر 0-10 سنوات

سيساعد حصول طفلك على اللقاحات في موعدها على حمايته من 18 مرضًا يمكن الوقاية منه باللقاحات. اسأل مقدم الرعاية الصحية لطفلك عما إذا كان طفلك قد حصل على كل اللقاحات الموصى بها أم لا.

هل حصل طفلك على آخر لقاح؟	اللقاح
يحتاج طفلك لجرعتين من لقاح الجدري المائي. يتم أخذ الجرعة الأولى عند عمر 12-15 شهرًا والجرعة الثانية عند عمر 4-6 سنوات.	الجدري المائي (الحماق؛ Var)
يحتاج كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق إلى لقاح كوفيد-19 وفقًا لتوصيات المراكز الحالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. يمنع اللقاح مضاعفات كوفيد-19 النادرة ولكنها خطيرة على الأطفال.	كوفيد-19
يحتاج طفلك 5 جرعات من لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي. يتم إعطاء الجرعة الأولى عند عمر شهرين، والجرعة الثانية عند عمر 4 شهور، والجرعة الثالثة عند عمر 6 شهور، والجرعة الرابعة عند عمر 15-18 شهرًا، والجرعة الخامسة عند عمر 4-6 سنوات.	الدفتيريا، والتيتانوس (الكزاز)، والشاهوق (السعال الديكي؛ DTaP)
يحتاج طفلك إلى 3-4 جرعات من لقاح Hib، بناءً على نوع العلامة التجارية للقاح. يتم إعطاء الجرعة الأولى عند عمر شهرين، والجرعة الثانية عند عمر 4 شهور، والجرعة الثالثة عند عمر 6 شهور (إذا لزم الأمر)، والجرعة الأخيرة عند عمر 12-15 شهرًا.	المستدمية النزلية من النوع b (Hib)
يحتاج طفلك جرعتين من لقاح التهاب الكبد الوبائي A. يتم إعطاء الجرعة الأولى عند عمر عام، والجرعة الثانية بعدها عند عمر 6-18 شهرًا.	التهاب الكبد الوبائي A (HepA)
يحتاج طفلك إلى 3 جرعات على الأقل من لقاح التهاب الكبد الوبائي B، بناءً على نوع العلامة التجارية للقاح. تُعطى الجرعة الأولى عند الولادة، والجرعة الثانية عند عمر شهر إلى شهرين، والجرعة النهائية عند عمر 6-18 شهرًا.	التهاب الكبد الوبائي B (HepB)
يُعطى لقاح فيروس الورم الحليمي البشري بشكل روتيني للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 أو 12 سنة، ولكن يمكن أن يبدأ إعطاؤه عند عمر 9 سنوات. يجب وجود فاصل زمني مدته 6-12 شهرًا بين هذه السلسلة المكونة من جرعتين.	فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)
يحتاج كل طفل يبلغ عمره 6 شهور فما فوق إلى لقاح الإنفلونزا كل خريف أو شتاء. يحتاج بعض الأطفال الأقل من عمر 9 سنوات جرعتين. اسأل مقدم الرعاية الصحية لطفلك عما إذا كان طفلك يحتاج إلى أكثر من جرعة واحدة هذا الموسم.	الإنفلونزا (Flu)
يحتاج طفلك جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. يتم أخذ الجرعة الأولى عند عمر 12-15 شهرًا والجرعة الثانية عند عمر 4-6 سنوات.	الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)
يحتاج الرضع والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-10 سنوات ممن يعانون من حالات صحية معينة (مثل طحال لا يؤدي وظائفه) إلى لقاح MenACWY أو لقاح MenB إذا كانوا في سن العاشرة. تحدث مع مقدم الرعاية الصحية لمعرفة ما إذا كان طفلك يحتاج للقاح المكورات السحائية.	المكورات السحائية (MenB، MenACWY)
يحتاج طفلك إلى 4 جرعات من اللقاح المتقارن (PCV). يتم إعطاء الجرعة الأولى عند عمر شهرين، والجرعة الثانية عند عمر 4 شهور، والجرعة الثالثة عند عمر 6 شهور، والجرعة الرابعة عند عمر 12-15 شهرًا. يحتاج بعض الأطفال الأكبر سنًا الذين يعانون من حالات صحية معينة أيضًا إلى تطعيم مكورات رئوية إضافي. اسأل مقدم الرعاية الصحية لطفلك عما إذا كان طفلك يحتاج هذه الوقاية الإضافية من مرض المكورات الرئوية.	المكورات الرئوية (اللقاح المتقارن [PCV]؛ اللقاح عديد السكاريد، [PPSV23])
يحتاج طفلك إلى 4 جرعات من لقاح شلل الأطفال (IPV) لوقايته من شلل الأطفال. يتم إعطاء الجرعة الأولى عند عمر شهرين، والجرعة الثانية عند عمر 4 شهور، والجرعة الثالثة عند عمر 6-18 شهرًا، والجرعة الرابعة عند عمر 4-6 سنوات.	شلل الأطفال (IPV)
من أكتوبر إلى مارس، قد يحتاج الأطفال الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين الولادة وحتى 7 أشهر إلى الجسم المضاد الوقائي للفيروس المخلوي التنفسي (RSV-mAb) إذا لم يتم إعطاء لقاح الفيروس المخلوي التنفسي أثناء الحمل. قد يحتاج بعض الرضع الأكبر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و19 شهرًا المعرضين لخطر كبير إلى RSV-mAb خلال موسمهم الثاني من RSV.	الجسم المضاد الوقائي للفيروس المخلوي التنفسي (RSV-mAb)
يحتاج طفلك إلى 2-3 جرعات من لقاح الفيروس العجلية (RV)، بناءً على نوع العلامة التجارية للقاح. يتم أخذ الجرعة الأولى عند عمر شهرين، والثانية عند عمر 4 شهور، والثالثة (إذا لزم الأمر) عند عمر 6 شهور.	الفيروس العجلية (RV)

هل سيسافر طفلك خارج الولايات المتحدة؟ تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لـ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها) على wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list للحصول على معلومات السفر، أو قم باستشارة عيادة سفر.

