

# متى يحتاج الأطفال والمراهقون إلى التطعيمات؟

الإنفلونزا Flu	MenB	Men- ACWY	HPV فيروس الورم الحليمي البشري	حمى الضنك	كوفيد-19	HepA التهاب الكبد الوبائي A	الحماق الجدري المائي	MMR الحصبة والكاف والحصبة الألمانية	RV الفيروس العجلي	PCV المكورات الرئوية المتقارن	IPV شلل الأطفال	Hib المستدمية النزلية من النوع b	DTaP/Tdap الدفتيريا والتيتانوس والشاهوق (السعال الديكي)	RSV- mAb	HepB التهاب الكبد الوبائي B	العمر
														2✓ (7-0 شهور)	✓	عند الولادة
									✓	✓	✓	✓	✓		✓	شهران
									✓	✓	✓	✓	✓		1✓	4 شهور
✓									1✓	✓	✓	1✓	✓		✓	6 شهور
											18-6) شهرًا				✓	8 شهور
														2✓ (19-8) شهرًا	✓	12 شهرًا
													3✓ (18-15) شهرًا		✓	15 شهرًا
																18 شهرًا
																23-19 شهرًا
											✓		✓			4-6 سنوات
																7-10 سنوات
																11-12 سنة
																13-15 سنة
																16-18 سنة

جرعة واحدة كل خريف أو شتاء. يحتاج بعض الأطفال الأصغر من 9 سنوات إلى جرعتين؛ أسأل مقدم الرعاية الصحية لطفلك عما إذا كان طفلك يحتاج إلى أكثر من جرعة واحدة.

يُوصى بلقاح الإنفلونزا كل عام لكل شخص عمه 6 شهور فأكثر

يُوصى بلقاح كوفيد-19 لكل شخص في عمر 6 شهور فأكثر

جرعتان يتم إعطاؤهما يفصل بينهما مدة 6 أشهر بشكل روتيني في عمر من 12 إلى 23 شهرًا

يُوصى أيضًا بإعطاء لقاح HepA (جرعتان) للأطفال والمراهقين الذين لم يسبق لهم الحصول على اللقاح

يُوصى بلقاح حمى الضنك لبعض الأطفال

7 سيحتاج الأطفال الذين يعانون من حالات طبية مُعَيَّنة إلى جرعة ثالثة.  
8 يمكن إعطاء هذا اللقاح للمراهقين الأصحاء. يُوصى به أيضًا للمراهقين الذين يعانون من حالات صحية مُعَيَّنة.  
9 قد يحتاج المراهق أيضًا إلى جرعة إضافية بناءً على توصية مقدم الرعاية الصحية.  
10 عند الحاجة إلى لقاحي MenACWY وMenB، يمكن استخدام لقاح MenABCWY المتقارن.

4 يحتاج الأطفال بعمر 5 سنوات أو أكبر عمومًا إلى جرعة واحدة فقط. يتم تحديد عدد الجرعات للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 4 سنوات حسب العلامة التجارية للقاح.  
5 يُوصى بإعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عامًا و يعيشون في بورتوريكو، وساموا الأمريكية، وجزر العذراء الأمريكية، وولايات ميكرونيزيا المتحدة، وجمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو، والذين تأكد مختبريًا إصابتهم سابقًا بحمى الضنك سلسلة مكونة من 3 جرعات من لقاح حمى الضنك.  
6 لقاح HPV روتيني في سن 11 أو 12 عامًا، لكن يمكن أن يبدأ في سن 9 سنوات.

1 قد لا يحتاج طفلك هذه الجرعة بناءً على العلامة التجارية للقاح الذي يستخدمه مقدم الرعاية الصحية.  
2 يجب أن يحصل الرضع الذين لم تحصل أمهاتهم على لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) أثناء الحمل والذين تقل أعمارهم عن 8 أشهر و0 يومًا على الأجسام المضادة الوقائية للفيروس المخلوي التنفسي (RSV-mAb) قبل موسم الفيروس المخلوي التنفسي أو خلاله (عادةً من أكتوبر إلى مارس). سيحتاج بعض الأطفال المعرضين لخطر مرتفع (من 8 إلى 19 شهرًا) إلى RSV-mAb قبل موسم RSV الثاني.  
3 يمكن إعطاء جرعة DTaP هذه مبكرًا عند عمر 12 شهرًا إذا مضت 6 شهور على الجرعة السابقة.

