

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE VACINA

Vacina contra a hepatite A: *O que você precisa saber*

Many vaccine information statements are available in Portuguese and other languages. See www.immunize.org/vis

Muitas declarações de informações sobre vacinas estão disponíveis em português e outros idiomas. Consulte www.immunize.org/vis

1. Por que se vacinar?

A vacina de **hepatite A** pode prevenir a **hepatite A**.

Hepatite A é uma doença hepática grave.

Geralmente se espalha através do contato próximo e pessoal com uma pessoa infectada ou quando uma pessoa ingere, sem saber, o vírus a partir de objetos, alimentos ou bebidas contaminados por pequenas quantidades de fezes de uma pessoa infectada.

A maioria dos adultos com hepatite A tem sintomas, incluindo fadiga, baixo apetite, dor de estômago, náusea e icterícia (pele ou olhos amarelos, urina escura, movimentos intestinais de cor clara). A maioria das crianças com menos de 6 anos de idade não apresenta sintomas.

Uma pessoa infectada com hepatite A pode transmitir a doença para outras pessoas mesmo que não tenha nenhum sintoma da doença.

A maioria das pessoas que contraem hepatite A sente doente por várias semanas, mas geralmente se recuperam completamente e não apresentam danos hepáticos duradouros. Em casos raros, a hepatite A pode causar insuficiência hepática e morte; isso é mais comum em pessoas com mais de 50 anos de idade e em pessoas com outras doenças hepáticas.

A vacina contra a hepatite A tornou essa doença muito menos comum nos Estados Unidos. Porém, surtos de hepatite A entre pessoas não-vacinadas ainda acontecem.

2. Vacina contra a hepatite A

Crianças precisam de 2 doses da vacina contra hepatite A:

- Primeira dose: 12 a 23 meses de idade
- Segunda dose: pelo menos 6 meses após a primeira dose

Bebês de 6 a 11 meses de idade viajando para fora dos Estados Unidos quando se recomenda proteção contra a hepatite A devem receber 1 dose de vacina contra a hepatite A. Essas crianças ainda devem receber 2 doses adicionais nas idades recomendadas para uma proteção duradoura.

Crianças mais velhas e adolescentes de 2 a 18 anos que não foram vacinadas anteriormente devem ser vacinadas.

Adultos que não foram vacinados anteriormente e desejam se proteger contra a hepatite A também podem receber a vacina.

A vacina contra a hepatite A também é recomendada para as seguintes pessoas:

- Viajantes internacionais
- Homens que tiveram contato sexual com outros homens
- Pessoas que usam medicamentos por injeção ou não injetáveis
- Pessoas que têm riscos ocupacionais de infecções
- Pessoas que preveem contato próximo com um estrangeiro
- Pessoas em situação de rua
- Pessoas com HIV
- Pessoas com doença hepática crônica

Além disso, uma pessoa que não tenha recebido anteriormente a vacina contra a hepatite A e que tenha contato direto com alguém com hepatite A deve receber a vacina contra a hepatite A o mais rápido possível e dentro de 2 semanas após a exposição.

A vacina contra a hepatite A deve ser fornecida ao mesmo tempo em que outras vacinas.



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

3. Converse com seu profissional de saúde

Diga ao seu profissional de saúde se a pessoa que receber a vacina:

- Teve **reação alérgica após uma dose anterior da vacina contra hepatite A** ou tem alguma **alergia grave e com risco à vida**

Em alguns casos, seu profissional de saúde pode decidir adiar a vacinação contra a hepatite A até uma visita futura.

Pessoas grávidas ou amamentando devem ser vacinadas se estiverem em risco de contrair hepatite A. A gravidez ou amamentação não são motivos para evitar a vacinação contra hepatite A.

Pessoas com doenças mais leves, como um resfriado, podem ser vacinadas. Pessoas com doenças moderadas ou graves normalmente devem aguardar até que se recuperem antes de receber a vacina da hepatite A.

Seu profissional de saúde pode fornecer mais informações.

4. Riscos de uma reação à vacina

- Dores ou vermelhidão onde a vacina é administrada, febre, dor de cabeça, cansaço ou perda de apetite podem ocorrer após a vacinação contra a hepatite A.

As pessoas às vezes desmaiam após procedimentos médicos, incluindo vacinação. Avise o profissional de saúde se sentir tontura ou tiver alterações na visão ou zumbido nos ouvidos.

Assim como com qualquer medicamento, existe uma chance muito remota de uma vacina causar reação alérgica grave, outros ferimentos graves ou morte.

5. E se houver um problema grave?

Uma reação alérgica pode ocorrer após a pessoa vacinada sair da clínica. Se você perceber sinais de uma reação alérgica grave (urticária, inchaço do rosto e garganta, dificuldade para respirar, batimento cardíaco acelerado, tontura ou fraqueza), ligue para **9-1-1** e leve a pessoa ao hospital mais próximo.

Para outros sinais que o preocupam, ligue para seu profissional de saúde.

Reações adversas devem ser relatadas ao Sistema de Relatórios de Eventos Adversos de Vacinas (VAERS). Seu profissional de saúde normalmente preencherá este relatório ou você mesmo pode fazê-lo. Visite o site do VAERS em www.vaers.hhs.gov ou ligue para **1-800-822-7967**. O VAERS serve apenas para relatar reações, e membros da equipe VAERS não fornecem orientações médicas.

6. O Programa Nacional de Compensação por Lesões por Vacinas

O Programa Nacional de Compensação por Lesões por Vacinas (VICP) é um programa federal que foi criado para compensar pessoas que podem ter sido lesionadas por certas vacinas. Alegações de supostas lesões ou morte devido à vacinação têm um limite de tempo para serem encaminhadas, o que pode ser no máximo dois anos. Visite o site do VICP em www.hrsa.gov/vaccinecompensation ou ligue para **1-800-338-2382** para saber mais sobre o programa e como encaminhar uma alegação.

7. Como posso saber mais?

- Pergunte ao seu profissional de saúde.
- Ligue para o seu departamento de saúde local ou estadual.
- Visite o site da Food and Drug Administration (FDA) para as bulas das vacinas e mais informações em www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines.
- Entre em contato com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC):
 - Ligue para **1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)** ou
 - Visite o site do CDC em www.cdc.gov/vaccines.

Portuguese Translation provided by Massachusetts Dept. of Public Health, Immunization Program

