



COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - COREMU

PROCESSO SELETIVO 2022  
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE

## CIRURGIA DE PEQUENOS ANIMAIS

### INSTRUÇÕES

- Verifique se este **Caderno** corresponde ao Programa de Residência ao qual você se candidatou e se ele contém **trinta** questões objetivas (questões de 01 a 30). Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Você dispõe de quatro horas (4h) para realizar a prova, incluindo o tempo destinado ao preenchimento da folha de respostas das questões objetivas.
- Para cada **questão objetiva**, existe apenas **uma** alternativa correta.
- Ao transcrever suas respostas para a folha de respostas, faça-o com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o documento oficial do Concurso e não será substituída. Preencha completamente as elipses ( ● ) na folha de respostas.
- Utilize caneta esferográfica de tinta azul ou preta para assinalar as respostas das questões objetivas na folha de respostas.
- Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, revistas, folhetos, impressos de qualquer natureza ou anotações; nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou quaisquer equipamentos eletrônicos.
- Ao concluir, levante a mão e aguarde o fiscal. Os dois últimos candidatos deverão se retirar da sala de prova ao mesmo tempo.
- O candidato somente poderá se retirar da sala uma hora (1h) após o início da prova. Se quiser levar o Caderno de Questões, o candidato somente poderá se retirar da sala uma hora e meia (1h30min) após o início da prova. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.
- Os candidatos terão direito de permanecer na sala até que o último candidato conclua a prova, desde que permaneçam em silêncio.
- A folha de respostas é a prova legal exclusiva de suas respostas. Devolva-a ao fiscal da sala, sob pena de exclusão do Concurso.

Nome do(a) candidato(a)

Número de inscrição

**Comissão Permanente de Seleção – COPERSE**

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.



---

**01.** Considere o conceito abaixo.

Organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e inter-dependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população – prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e com equidade – e com responsabilidades sanitária e econômica, gerando valor para a população.

Assinale a alternativa que representa corretamente o conceito.

- (A) Atenção primária à saúde.
- (B) Clínica ampliada em saúde.
- (C) Controle social em saúde.
- (D) Estratégia de saúde da família.
- (E) Rede de atenção à saúde.

---

**02.** Considere as afirmações abaixo, sobre a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS).

- I - A PNEPS assume a regionalização da gestão do SUS como base para desenvolver iniciativas de enfrentamento das carências e necessidades do sistema nacional de saúde; portanto, precisa ser pensada e adaptada às situações de saúde em cada nível local do sistema.
- II - A Educação Permanente em Saúde (EPS) configura-se como aprendizagem no trabalho, em que aprender e ensinar incorporam-se ao cotidiano dos serviços de saúde e do processo de trabalho.
- III- A PNEPS caracteriza-se como uma vertente educacional com potencialidades ligadas a mecanismos e temas que possibilitam gerar reflexão sobre o processo de trabalho, a autogestão, a mudança institucional e a transformação das práticas nos serviços, por meio da proposta do aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de construir cotidianos e eles mesmos se constituírem como objeto de aprendizagem individual, coletiva e institucional.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

---

**03.** Considere a afirmação abaixo.

A ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população são influenciados pelos aspectos sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais.

Assinale a alternativa que diz respeito a essa afirmação.

- (A) Determinantes sociais da saúde.
- (B) Epidemiologia.
- (C) Iniquidades em saúde.
- (D) Processo saúde-doença.
- (E) Saúde pública.

---

**04.** Considere as afirmações abaixo, sobre os elementos constitutivos da Rede de Atenção à Saúde.

- I - O primeiro elemento das redes de atenção à saúde e sua razão de ser é uma população, colocada sob sua responsabilidade sanitária e econômica. É isso que marca a atenção à saúde baseada na população, uma característica essencial das redes de atenção à saúde.
- II - O segundo elemento constitutivo é a responsabilidade fundamental da atenção primária pelo processo de territorialização; cadastramento das famílias; classificação das famílias por riscos socio sanitários; vinculação das famílias à unidade de atenção primária à saúde; identificação de subpopulações com fatores de riscos e com condições de saúde muito complexas.
- III- O terceiro elemento constitutivo das redes de atenção à saúde são os modelos de atenção à saúde, aqui entendidos como sistemas lógicos que organizam o funcionamento das redes de atenção à saúde, definidos em função da visão prevalecte da saúde, das situações demográfica e epidemiológica e dos determinantes sociais da saúde, vigentes em determinado tempo e em determinada sociedade. Há modelos de atenção à saúde para as condições agudas e crônicas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

---

**05.** Leia o que diz Rui Barbosa, em 1921, na Oração aos Moços.

"...A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigalam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo não dar a cada um na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos se equivalessem..."

Assinale a alternativa que indica corretamente o conceito em saúde, apresentado pelo texto.

- (A) Acolhimento.
- (B) Controle social.
- (C) Equidade.
- (D) Integralidade.
- (E) Universalidade.

---

**06.** Considere as afirmações abaixo, sobre o Sistema Único de Saúde, seus princípios e sua historicidade.

- I - O Sistema Único de Saúde (SUS) nasceu legitimamente de uma conquista popular, que foi desencadeada ainda na década de 70, em consonância com os ideais da Reforma Sanitária. Nesses 30 anos de criação do SUS, muitos foram os avanços, principalmente no que se refere aos princípios de universalidade e descentralização dos serviços.
- II - O SUS, apesar das dificuldades, tem permanecido como referência para outras democracias, promovendo orientação, prevenção, reabilitação e manutenção da saúde, cujo foco principal é o atendimento de forma universal, integral e com equidade em todos os níveis de atenção.
- III- A saúde coletiva é entendida como campo científico, onde se produzem saberes e conhecimentos acerca do objeto saúde e onde operam distintas disciplinas que o contemplam sob vários ângulos; e como prática social, onde se realizam ações em diferentes organizações e instituições por diversos agentes dentro e fora do espaço convencionalmente reconhecido como setor saúde. Assim, como campo de saber específico, a saúde coletiva acontece tanto no nível científico como no das práticas socio sanitárias.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

---

**07.** Assinale a alternativa correta sobre conceitos e definições em Epidemiologia.

- (A) A endemia diz respeito à frequência com que surgem novos casos de uma doença num intervalo de tempo, como se fosse um filme sobre a ocorrência da doença, no qual cada quadro pode conter um novo caso ou novos casos. É, assim, uma medida dinâmica.
- (B) A prevalência refere-se ao número de casos existentes de uma doença em um dado momento; é uma "fotografia" sobre a sua ocorrência, sendo assim uma medida estática. Os casos existentes são daqueles que adoeceram em algum momento do passado, somados aos casos novos dos que ainda estão vivos e doentes.
- (C) A letalidade é uma medida muito utilizada como indicador de saúde; é calculada dividindo o número de óbitos pela população em risco.
- (D) A mortalidade é uma medida da gravidade da doença, calculada dividindo o número de óbitos por determinada doença pelo número de casos da mesma doença. Algumas doenças apresentam mortalidade nula, como, por exemplo, escabiose; já para outras, a mortalidade é igual ou próxima de 100%, como a raiva humana.
- (E) A epidemia refere-se a uma doença habitualmente presente entre membros de um determinado grupo, dentro dos limites esperados, em uma determinada área geográfica, por um período de tempo ilimitado.

---

**08.** Considere as afirmações abaixo, sobre atribuições dos profissionais em atuação na Atenção Básica.

- I - Estabelecer, nos respectivos Planos Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde, prioridades, estratégias e metas para a organização da Atenção Básica.
- II - Garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando diversas racionalidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas e Complementares.
- III- Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado, realizando classificação de risco, identificando as necessidades de intervenções de cuidado, responsabilizando-se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

---

**09.** Leia o texto abaixo, sobre princípios e diretrizes da Atenção Básica, orientadores para sua organização nos municípios.

É o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, da redução de danos e dos cuidados paliativos. Inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento adequado das necessidades biológicas, psicológicas, ambientais e sociais causadoras das doenças, e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a esses fins, além da ampliação da autonomia das pessoas e coletividade.

Assinale a alternativa que diz respeito a esse texto.

- (A) Integralidade do cuidado.
- (B) Rede de atenção à saúde.
- (C) Regionalização e hierarquização.
- (D) Resolutividade do sistema.
- (E) Universalidade do acesso.

---

**10.** Leia o texto abaixo, sobre a Bioética em pesquisa com seres humanos.

Define a anuência do participante da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar.

Assinale a alternativa que diz respeito a esse texto.

- (A) Assentimento livre e esclarecido.
- (B) Assistência ao participante da pesquisa.
- (C) Consentimento livre e esclarecido.
- (D) Risco da pesquisa.
- (E) Sigilo e privacidade dos participantes.

---

**11.** Com relação à esterilização e à desinfecção cirúrgica, o padrão mínimo de tempo e temperatura para esterilizadores de deslocamento por gravidade é de

- (A) 10 a 15 minutos a 121 °C – 130 °C.
- (B) 10 a 15 minutos a 132 °C – 135 °C.
- (C) 15 a 30 minutos a 132 °C – 135 °C.
- (D) 15 a 30 minutos a 140 °C – 154 °C.
- (E) 40 a 60 minutos a 121 °C.

---

**12.** Considere as afirmações abaixo, sobre cuidados pré, trans e pós-operatórios.

I - A administração de oxigênio por fluxo contínuo é usada na estabilização emergencial em curto prazo a uma taxa de fluxo de 1 a 2 litros/minuto.

II - Os cateteres nasais podem ser utilizados quando é necessário um oferecimento mais prolongado de oxigênio, numa taxa de fluxo de 50 a 100 ml/kg/min.

III- O uso do colar elizabetano, coberto com um material plástico para criar um ambiente rico em oxigênio a uma taxa de fluxo de 0,75 a 1 litro/minuto, é uma alternativa aos pacientes com intolerância ao cateter nasal e quando não tiver a disponibilidade de uma gaiola de oxigênio.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

---

**13.** Com relação à instrumentação cirúrgica, qual pinça hemostática, abaixo, apresenta ranhuras dispostas transversalmente nos dois terços iniciais da garra, podendo ser reta e curva, com tamanhos entre 13 e 15 centímetros de comprimento?

- (A) Halsted.
- (B) Crile.
- (C) Kelly.
- (D) Kocher.
- (E) Rochester - Carmalt.

---

**14.** Com relação às bases fundamentais da técnica cirúrgica, qual fio cirúrgico, abaixo, é classificado como fio sintético não reabsorvível com fios multifilamentados trançados?

- (A) Poliéster.
- (B) Poliamida.
- (C) Polipropileno.
- (D) Poliglactina 910.
- (E) Poligliconato.

---

**15.** Com relação às bases fundamentais da técnica cirúrgica, qual é o nome da sutura descontínua, em que a agulha entra pela mucosa e sai na adventícia, no sentido de dentro para fora, e, após cruzar a ferida, volta no sentido contrário, ou seja, da adventícia para a mucosa, de modo que o nó cirúrgico fique para dentro da luz do órgão?

- (A) Donatti.
- (B) Wolff.
- (C) Swift.
- (D) Lambert.
- (E) Jaquetão.

---

**16.** Considere as afirmações abaixo, sobre cirurgia do sistema tegumentar.

I - Os hidrogéis são formulações utilizadas para tratar feridas secas, esfaceladas ou necrosadas. São muito absorventes, criando um ambiente úmido na ferida, o que promove desbridamento, granulação e epitelização. São muito eficazes na hidratação de feridas e aumentam a atividade da colagenase para facilitar o desbridamento autolítico e promover a granulação.

II - Os hidrocoloides mantêm um ambiente úmido, promovendo o desbridamento autolítico e isolando o leito da ferida. Não são projetados para feridas intensamente exudativas e infectadas.

III- Os alginatos de cálcio são apropriados para feridas com quantidade moderada ou grande de exsudato, durante a fase inflamatória e de reparação. A sua aplicação em feridas secas ou pouco exudativas permite a aderência, sendo contraindicada.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

---

**17.** Com relação à cirurgia do sistema tegumentar, qual o retalho de padrão axial usado para cobrir defeitos que envolvem a região caudal do abdome, flancos, prepúcio, períneo, coxas e membros posteriores?

- (A) Omocervical.
- (B) Toracodorsal.
- (C) Epigástrico superficial caudal.
- (D) Ilíaco circunflexo profundo.
- (E) Genicular.

---

**18.** Considere as afirmações abaixo, sobre cirurgia do sistema oftálmico.

- I - Os retalhos da terceira pálpebra servem como bandagem fisiológica para proteger e sustentar a córnea após um trauma.
- II - A enucleação é a remoção do globo ocular, da membrana nictitante, do conteúdo orbital e das margens palpebrais.
- III- A exenteração é a remoção do globo ocular, da membrana nictitante e das margens palpebrais.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

---

**19.** Com relação à cirurgia da orelha, qual das técnicas, abaixo, proporciona a maior exposição da cavidade timpânica?

- (A) Ressecção lateral do canal auditivo.
- (B) Ablação vertical do canal auditivo.
- (C) Ablação total do canal auditivo.
- (D) Osteotomia bular lateral.
- (E) Osteotomia bular ventral.

**20.** Considere as afirmações abaixo, sobre hérnias.

- I - As hérnias verdadeiras são aquelas que contêm saco herniário, anel herniário e conteúdo herniário.
- II - As hérnias umbilicais podem ter fechamento espontâneo até os 6 meses de idade.
- III- As hérnias inguinais ocorrem quando o defeito do anel inguinal permite a protrusão de conteúdo abdominal para o interior do processo vaginal adjacente ao cordão espermático.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

---

**21.** Considere as afirmações abaixo, sobre fístula oronasal congênita.

- I - A palatoplastia, realizada antes de 16 semanas de idade em cães com fístula oronasal congênita, pode retardar o crescimento e o desenvolvimento maxilofaciais.
- II - A desvantagem do retalho bipediculado deslizante é que o reparo não tem sistentação e está diretamente sobre o defeito.
- III- A deiscência dos pontos após a sua correção, caso ocorra, indica que uma nova tentativa deve ser protelada por 4 a 6 semanas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

---

**22.** Considere as afirmações abaixo, sobre dilatação vólculo-gástrica.

- I - A compressão da veia cava caudal e da veia porta pelo estômago distendido aumenta o retorno venoso e o débito cardíaco, causando isquemia do miocárdio.
- II - O lúmen gástrico deve ser sempre acessado, para exploração e adequado esvaziamento de seu conteúdo.
- III- A recidiva, para ser evitada, sempre deve ser realizada após a correção cirúrgica da dilatação vólculo-gástrica.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

---

**23.** Com relação à cirurgia de fígado, a manobra de Pringle é uma

- (A) técnica utilizada no controle de extravasamento de bile, durante uma colecistectomia.
- (B) técnica utilizada no controle de um sangramento hepático excessivo, no trans-cirúrgico.
- (C) técnica de biópsia hepática utilizando uma pinça TruCut.
- (D) técnica de biópsia hepática, utilizando a técnica de guilhotina.
- (E) técnica utilizada para facilitar a exposição da veia cava, durante a lobectomia.

---

**24.** Com relação à adrenalectomia, qual das alternativas abaixo é uma complicação em potencial da cirurgia, após a ressecção de neoplasia adrenal, com risco à vida do animal?

- (A) Tromboembolia pulmonar.
- (B) Arritmia cardíaca.
- (C) Insuficiência hepática aguda.
- (D) Insuficiência renal aguda.
- (E) Gastroenterite hemorrágica.

---

**25.** Considere as afirmações abaixo, sobre nefrectomia.

- I - Todos os ramos da artéria renal devem ser identificados e uma ligadura da artéria renal deve ser feita.
- II - As veias ovarianas e testiculares direitas drenam para a veia renal e não devem ser ligadas em cães não castrados.
- III- O ureter deve ser ligado próximo à saída da pelve renal.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

---

**26.** Considere as afirmações abaixo, sobre a cirurgia do sistema reprodutivo feminino.

- I - A piometra desenvolve-se durante o proestro.
- II - A piometra com a cérvix fechada evita a drenagem do fluido contaminado e causa uma doença mais grave.
- III- As anormalidades concomitantes em animais com piometra podem incluir hipoglicemia, disfunção hepática e renal, anemia e/ou anormalidades cardíacas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

---

**27.** Considere as afirmações abaixo, sobre a cirurgia do sistema reprodutivo masculino.

I - A produção excessiva de testosterona dos tumores testiculares de célula intersticial pode contribuir para a ocorrência de adenomas perianais, hérnias perineais e hiperplasia prostática benigna.

II - Os cães com tumores testiculares da célula de Sertori geralmente apresentam sinais de hiperestrogenismo.

III- Os sinais de feminização raramente ocorrem em cães com seminomas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

---

**28.** Considere as afirmações abaixo, sobre hérnia diafragmática traumática.

I - A ruptura ocorre normalmente na porção tendinosa central do diafragma.

II - O estômago é o órgão mais comumente herniado em cães.

III- A complicação mais comum após o reparo cirúrgico é o pneumotórax, especialmente se a hérnia for crônica e as aderências estiverem presentes.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**29.** Com relação à luxação de patela medial em cães, qual o grau de luxação quando a patela permanece luxada medialmente a maior parte do tempo, mas pode ser reduzida manualmente com a extensão do joelho, mesmo que, após a redução manual, a flexão e a extensão do joelho resultem em uma nova luxação patelar, podendo estar presentes anormalidades dos tecidos de suporte da articulação do joelho?

- (A) Grau I.
- (B) Grau II.
- (C) Grau III.
- (D) Grau IV.
- (E) Grau V.

---

**30.** Com relação à neurocirurgia de pequenos animais, o procedimento que se refere à criação de um defeito ósseo na parte ventral de um espaço intervertebral cervical, para obter entrada e visualização do canal vertebral ventral, é definido como

- (A) foraminotomia.
- (B) slot ventral.
- (C) facetectomia.
- (D) fenestração.
- (E) hemilaminectomia.