



COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - COREMU

PROCESSO SELETIVO 2022  
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE

## CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAIS

### INSTRUÇÕES

- Verifique se este **Caderno** corresponde ao Programa de Residência ao qual você se candidatou e se ele contém **trinta** questões objetivas (questões de 01 a 30) e **duas** questões dissertativas (questões 31 e 32). Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Você dispõe de quatro horas (4h) para realizar a prova, incluindo o tempo destinado ao preenchimento da folha de respostas das questões objetivas e à transcrição das questões dissertativas.
- Para cada **questão objetiva**, existe apenas **uma** alternativa correta.
- Ao transcrever suas respostas para a folha de respostas, faça-o com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o documento oficial do Concurso e não será substituída. Preencha completamente as elipses ( ● ) na folha de respostas.
- Não assine nem coloque seu nome na Folha de Respostas Dissertativas. Assine no campo específico para tal fim (**parte destacável do rodapé da página**), atendendo, conforme Edital, ao procedimento de **desidentificação** das questões dissertativas.
- Qualquer identificação do candidato na Folha de Respostas Dissertativas, fora do espaço destacável, como o registro de nome ou do número de inscrição, implicará a anulação da resposta às questões dissertativas.
- Utilize caneta esferográfica de tinta azul ou preta para assinalar as respostas das questões objetivas na folha de respostas e para responder as questões dissertativas na Folha de Respostas Dissertativas.
- Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, revistas, folhetos, impressos de qualquer natureza ou anotações; nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou quaisquer equipamentos eletrônicos.
- Ao concluir, levante a mão e aguarde o fiscal. Os dois últimos candidatos deverão se retirar da sala de prova ao mesmo tempo.
- O candidato somente poderá se retirar da sala uma hora (1h) após o início da prova. Se quiser levar o Caderno de Questões, o candidato somente poderá se retirar da sala uma hora e meia (1h30min) após o início da prova. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.
- Os candidatos terão direito de permanecer na sala até que o último candidato conclua a prova, desde que permaneçam em silêncio.
- As folhas de respostas são a prova legal exclusiva de suas respostas. Devolva-as ao fiscal da sala, sob pena de exclusão do Concurso.

Nome do(a) candidato(a)

Número de inscrição

**Comissão Permanente de Seleção – COPERSE**

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.



---

**01.** Considere o conceito abaixo.

Organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e inter-dependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população – prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e com equidade – e com responsabilidades sanitária e econômica, gerando valor para a população.

Assinale a alternativa que representa corretamente o conceito.

- (A) Atenção primária à saúde.
- (B) Clínica ampliada em saúde.
- (C) Controle social em saúde.
- (D) Estratégia de saúde da família.
- (E) Rede de atenção à saúde.

---

**02.** Considere as afirmações abaixo, sobre a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS).

- I - A PNEPS assume a regionalização da gestão do SUS como base para desenvolver iniciativas de enfrentamento das carências e necessidades do sistema nacional de saúde; portanto, precisa ser pensada e adaptada às situações de saúde em cada nível local do sistema.
- II - A Educação Permanente em Saúde (EPS) configura-se como aprendizagem no trabalho, em que aprender e ensinar incorporam-se ao cotidiano dos serviços de saúde e do processo de trabalho.
- III- A PNEPS caracteriza-se como uma vertente educacional com potencialidades ligadas a mecanismos e temas que possibilitam gerar reflexão sobre o processo de trabalho, a autogestão, a mudança institucional e a transformação das práticas nos serviços, por meio da proposta do aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de construir cotidianos e eles mesmos se constituírem como objeto de aprendizagem individual, coletiva e institucional.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

---

**03.** Considere a afirmação abaixo.

A ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população são influenciados pelos aspectos sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais.

Assinale a alternativa que diz respeito a essa afirmação.

- (A) Determinantes sociais da saúde.
- (B) Epidemiologia.
- (C) Iniquidades em saúde.
- (D) Processo saúde-doença.
- (E) Saúde pública.

---

**04.** Considere as afirmações abaixo, sobre os elementos constitutivos da Rede de Atenção à Saúde.

- I - O primeiro elemento das redes de atenção à saúde e sua razão de ser é uma população, colocada sob sua responsabilidade sanitária e econômica. É isso que marca a atenção à saúde baseada na população, uma característica essencial das redes de atenção à saúde.
- II - O segundo elemento constitutivo é a responsabilidade fundamental da atenção primária pelo processo de territorialização; cadastramento das famílias; classificação das famílias por riscos socio sanitários; vinculação das famílias à unidade de atenção primária à saúde; identificação de subpopulações com fatores de riscos e com condições de saúde muito complexas.
- III- O terceiro elemento constitutivo das redes de atenção à saúde são os modelos de atenção à saúde, aqui entendidos como sistemas lógicos que organizam o funcionamento das redes de atenção à saúde, definidos em função da visão prevalectente da saúde, das situações demográfica e epidemiológica e dos determinantes sociais da saúde, vigentes em determinado tempo e em determinada sociedade. Há modelos de atenção à saúde para as condições agudas e crônicas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

---

**05.** Leia o que diz Rui Barbosa, em 1921, na Oração aos Moços.

"...A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigalam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo não dar a cada um na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos se equivalessem..."

Assinale a alternativa que indica corretamente o conceito em saúde, apresentado pelo texto.

- (A) Acolhimento.
- (B) Controle social.
- (C) Equidade.
- (D) Integralidade.
- (E) Universalidade.

---

**06.** Considere as afirmações abaixo, sobre o Sistema Único de Saúde, seus princípios e sua historicidade.

- I - O Sistema Único de Saúde (SUS) nasceu legitimamente de uma conquista popular, que foi desencadeada ainda na década de 70, em consonância com os ideais da Reforma Sanitária. Nesses 30 anos de criação do SUS, muitos foram os avanços, principalmente no que se refere aos princípios de universalidade e descentralização dos serviços.
- II - O SUS, apesar das dificuldades, tem permanecido como referência para outras democracias, promovendo orientação, prevenção, reabilitação e manutenção da saúde, cujo foco principal é o atendimento de forma universal, integral e com equidade em todos os níveis de atenção.
- III- A saúde coletiva é entendida como campo científico, onde se produzem saberes e conhecimentos acerca do objeto saúde e onde operam distintas disciplinas que o contemplam sob vários ângulos; e como prática social, onde se realizam ações em diferentes organizações e instituições por diversos agentes dentro e fora do espaço convencionalmente reconhecido como setor saúde. Assim, como campo de saber específico, a saúde coletiva acontece tanto no nível científico como no das práticas socio sanitárias.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

---

**07.** Assinale a alternativa correta sobre conceitos e definições em Epidemiologia.

- (A) A endemia diz respeito à frequência com que surgem novos casos de uma doença num intervalo de tempo, como se fosse um filme sobre a ocorrência da doença, no qual cada quadro pode conter um novo caso ou novos casos. É, assim, uma medida dinâmica.
- (B) A prevalência refere-se ao número de casos existentes de uma doença em um dado momento; é uma "fotografia" sobre a sua ocorrência, sendo assim uma medida estática. Os casos existentes são daqueles que adoeceram em algum momento do passado, somados aos casos novos dos que ainda estão vivos e doentes.
- (C) A letalidade é uma medida muito utilizada como indicador de saúde; é calculada dividindo o número de óbitos pela população em risco.
- (D) A mortalidade é uma medida da gravidade da doença, calculada dividindo o número de óbitos por determinada doença pelo número de casos da mesma doença. Algumas doenças apresentam mortalidade nula, como, por exemplo, escabiose; já para outras, a mortalidade é igual ou próxima de 100%, como a raiva humana.
- (E) A epidemia refere-se a uma doença habitualmente presente entre membros de um determinado grupo, dentro dos limites esperados, em uma determinada área geográfica, por um período de tempo ilimitado.

---

**08.** Considere as afirmações abaixo, sobre atribuições dos profissionais em atuação na Atenção Básica.

- I - Estabelecer, nos respectivos Planos Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde, prioridades, estratégias e metas para a organização da Atenção Básica.
- II - Garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando diversas racionalidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas e Complementares.
- III- Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado, realizando classificação de risco, identificando as necessidades de intervenções de cuidado, responsabilizando-se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

---

**09.** Leia o texto abaixo, sobre princípios e diretrizes da Atenção Básica, orientadores para sua organização nos municípios.

É o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, da redução de danos e dos cuidados paliativos. Inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento adequado das necessidades biológicas, psicológicas, ambientais e sociais causadoras das doenças, e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a esses fins, além da ampliação da autonomia das pessoas e coletividade.

Assinale a alternativa que diz respeito a esse texto.

- (A) Integralidade do cuidado.
- (B) Rede de atenção à saúde.
- (C) Regionalização e hierarquização.
- (D) Resolutividade do sistema.
- (E) Universalidade do acesso.

---

**10.** Leia o texto abaixo, sobre a Bioética em pesquisa com seres humanos.

Define a anuência do participante da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar.

Assinale a alternativa que diz respeito a esse texto.

- (A) Assentimento livre e esclarecido.
- (B) Assistência ao participante da pesquisa.
- (C) Consentimento livre e esclarecido.
- (D) Risco da pesquisa.
- (E) Sigilo e privacidade dos participantes.

**11.** Sobre a fratura condilar em crianças, considere as afirmações abaixo.

- I - A fratura condilar pode resultar em hemartrose e subsequente anquilose da articulação temporomandibular.
- II - A fratura condilar pode alterar a função do centro de crescimento condilar, resultando em desenvolvimento de assimetria facial.
- III- O tratamento cirúrgico aberto é indicado para as fraturas extracapsulares, que limitam os movimentos mandibulares.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**12.** Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre a técnica de Artroplastia Biconvexa de Puricelli.

- ( ) Pode ser indicada em crianças com 10 anos de idade.
- ( ) Consiste na adaptação de superfícies articulares de titânio aos remanescentes ósseos.
- ( ) Exige a imobilização intermaxilar pós-operatória por 45 dias.
- ( ) Pode ser realizada bilateralmente, na mesma oportunidade cirúrgica.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) V – F – F – V.

**13.** Sobre as técnicas cirúrgicas para tratamento da articulação temporomandibular, considere as seguintes afirmações.

- I - A reconstrução com enxerto costochondral está contraindicada para pacientes adultos.
- II - A condilotomia pode ser indicada para pacientes com dor, ruído e hipomobilidade articular, que não respondem às terapias clínicas.
- III- A eminectomia está indicada em luxações recidivantes.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**14.** Sobre o tratamento cirúrgico de deformidades dentofaciais, considere as seguintes afirmações.

- I - A osteotomia vertical do ramo mandibular está indicada para tratamento do retrognatismo mandibular.
- II - A osteotomia sagital de Obwegeser-DalPont permite o tratamento do prognatismo mandibular.
- III- As osteotomias segmentares de maxila podem ser associadas à osteotomia do tipo Le Fort I.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**15.** Sobre a osteotomia mandibular de Puricelli, considere as afirmações abaixo.

- I - A técnica permite a rotação da mandíbula no sentido horário.
- II - A realização da técnica contraindica a realização da mentoplastia no mesmo ato cirúrgico.
- III- A técnica é contraindicada no tratamento cirúrgico da apneia obstrutiva do sono.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**16.** Sobre a retenção dentária, considere as afirmações abaixo.

- I - A discrepância do comprimento do arco dentário é uma causa de retenção.
- II - Os terceiros molares inferiores são os dentes mais frequentemente retidos.
- III- O trauma dentoalveolar é uma causa de retenção.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**17.** Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre a técnica de apicotomia.

- ( ) Está indicada para o canino superior retido com rizogênese incompleta.
- ( ) Está indicada para o canino superior retido com anquilose, envolvendo até 2/3 da raiz.
- ( ) Está indicada para o canino superior retido com dilaceração radicular.
- ( ) Promove a desvitalização do canino superior retido.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) V – F – F – V.

**18.** Sobre a técnica de laçada dupla (tração dupla) para tratamento da retenção dentária, considere as afirmações abaixo.

- I - A técnica está indicada para o incisivo central superior com dilaceração coronorradicular com rizogênese incompleta.
- II - A aplicação de forças no fio incisal promove o alongamento radicular.
- III- A aplicação de forças no fio cervical permite a rotação dentária.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

---

**19.** Sobre o tratamento cirúrgico do terceiro molar inferior retido horizontal, classificado por Pell e Gregory como Classe 2, B, considere a afirmações abaixo.

- I - Dispensa a realização de ostectomia.
- II - Dispensa a realização de odontosseção.
- III- Exige a realização de ostectomia e odontosseção.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

---

**20.** Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre os protocolos baseados no ATLS (*Advanced Trauma Life Support*).

- ( ) Os protocolos estabelecem sequências terapêuticas sistematizadas no atendimento do trauma físico agudo com risco de vida.
- ( ) A avaliação primária tem, como uma das prioridades, a manutenção da via aérea permeável.
- ( ) A avaliação secundária tem, como um dos objetivos, a proteção da coluna cervical.
- ( ) A avaliação secundária tem, como uma das prioridades, o controle de hemorragia.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) V – F – F – V.

**21.** Sobre o trauma envolvendo o complexo bucomaxilofacial, considere as afirmações abaixo.

- I - A fratura panfacial envolve dois ou três terços da face.
- II - O hematoma subconjuntival é um dos sinais de fratura do complexo zigomático.
- III- A fratura coronoide é a mais infrequente das fraturas mandibulares.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

---

**22.** Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre as lesões dos tecidos moles.

- ( ) Lesões comunicantes ou perforantes, localizadas nas áreas intra e extrabuciais, são suturadas da pele para a mucosa.
- ( ) Tecidos devitalizados devem ser removidos.
- ( ) Exames por imagem podem ser utilizados para identificação de corpos estranhos nas lacerações.
- ( ) Contusões apresentam descontinuidade dos tecidos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) V – F – F – V.

**23.** Sobre o diagnóstico de patologias do complexo bucomaxilofacial, considere as afirmações abaixo.

- I - A citologia exfoliativa substitui a biópsia cirúrgica para diagnóstico de lesões malignas.
- II - A punção aspirativa é a manobra que permite a sucção de líquido ou de ar contido no interior de lesões.
- III- A biópsia excisional está indicada para lesões com suspeita de malignidade.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**24.** Sobre o tratamento cirúrgico do freio labial superior, considere as afirmações abaixo.

- I - O septo ósseo interincisivo, em forma de "V", determina a realização de ostectomia.
- II - O tratamento cirúrgico está indicado após a erupção dos incisivos centrais decíduos.
- III- O tratamento cirúrgico pode ser realizado com anestesia local ou geral.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**25.** Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre o tratamento cirúrgico de patologias do complexo bucomaxilofacial.

- ( ) O odontoma deve ser tratado por enucleação.
- ( ) O mixoma odontogênico deve ser tratado por ressecção composta.
- ( ) O fibrodontoma ameloblástico deve ser tratado por enucleação.
- ( ) O ameloblastoma deve ser tratado por marsupialização.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) V – F – F – V.

**26.** Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre o diagnóstico e tratamento cirúrgico de patologias que acometem as glândulas salivares maiores.

- ( ) A biópsia por aspiração com agulha fina pode ser utilizada para diagnóstico dos tumores das glândulas salivares.
- ( ) A rânula pode ser tratada por marsupialização.
- ( ) A maior incidência de sialolitíase está associada à glândula sublingual.
- ( ) A maior incidência de adenoma pleomórfico está associada à glândula submandibular.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) V – F – F – V.

**27.** Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre as infecções do complexo bucomaxilofacial.

- ( ) As infecções em glândulas salivares são predominantemente fúngicas.
- ( ) As infecções virais podem acometer as glândulas parótidas.
- ( ) As infecções envolvendo o seio maxilar podem ter causa dentária.
- ( ) A sialolitíase envolvendo a glândula submandibular pode estar associada à infecção.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) V – F – F – V.

**28.** Sobre as infecções odontogênicas, considere as afirmações abaixo.

- I - O princípio de tratamento está baseado no uso de antimicrobianos.
- II - A sepse pode ser uma das complicações das infecções odontogênicas.
- III- A Angina de Ludwig é clinicamente caracterizada como um abscesso.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**29.** Sobre as técnicas anestésicas em Odontologia, considere as afirmações abaixo.

- I - A sedação consciente dispensa a realização de anestesia local para execução de uma exodontia de dente permanente.
- II - A anestesia geral é provocada pela combinação de fármacos.
- III- A anestesia de bloqueio troncular infraorbitário pode ser realizada por via extrabucal.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**30.** Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre as técnicas anestésicas em Odontologia.

- ( ) O bloqueio do nervo alveolar posterossuperior promove a anestesia da polpa mesiovestibular do primeiro molar superior, do lado correspondente.
- ( ) O bloqueio dos nervos alveolares superior anterior e médio promove a anestesia da polpa dentária de canino, incisivo lateral e incisivo central, do lado correspondente.
- ( ) O bloqueio do nervo alveolar inferior promove a anestesia da polpa dentária do terceiro molar ao incisivo central inferior, do lado correspondente.
- ( ) O bloqueio do nervo bucal promove a anestesia do periósteo e da mucosa vestibulares do terceiro molar ao segundo pré-molar inferior, do lado correspondente.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) V – F – F – V.

---

**Instrução das questões de caráter dissertativo:**

O texto final de cada uma de suas respostas deve

- ter extensão mínima de 15 linhas (aquém disso, sua resposta não será avaliada) e máxima de 30 linhas. Segmentos emendados, ou rasurados, ou repetidos, ou linhas em branco terão esses espaços descontados do cômputo total de linhas;
- ser escrito com caneta esferográfica azul e com letra legível, de tamanho regular, na folha própria para respostas.

**Instrução:** A questão **31** deve ser respondida com base na situação 1 abaixo.

Situação 1

Paciente masculino, 9 anos de idade, procura a Unidade de Saúde, localizada em território periférico, distante 20 km da região central da cidade. Apresenta queixa de dor dentária com evolução de 24 horas. O paciente vem acompanhado pelo pai, que é trabalhador autônomo. O familiar refere que o paciente sofreu queda da bicicleta no dia anterior e que, desde então, não aceita ingerir alimentos sólidos. No exame intrabucal, paciente em dentição mista, observa-se a fratura coronária, comprometendo esmalte e dentina, sem o envolvimento pulpar do incisivo central permanente superior direito e mordida cruzada no lado direito. O exame clínico extrabucal revela lesão contusa na pele na região do mento, limitação e desvio mandibular para a direita, durante a abertura bucal.

- 
- 31.** Identifique e analise, pelo menos, dois pontos considerados importantes para a área da Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais, integrada ao Sistema Único de Saúde.  
Proponha estratégias na gestão do cuidado e um plano terapêutico, justificando a sua escolha.

01.	
02.	
03.	
04.	
05.	
06.	
07.	
08.	
09.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	

---

**Instrução:** A questão **32** deve ser respondida com base na situação 2 abaixo.

Situação 2

Paciente feminina, 8 anos de idade, comparece ao ambulatório de CTBMF acompanhada pela mãe. Em contexto de pandemia, a família encontra-se em situação de vulnerabilidade social. A familiar refere que a paciente ainda não “trocou os dentes de leite” superiores. A observação foi feita pelo cirurgião-dentista que faz o acompanhamento clínico da paciente na Unidade de Saúde. Paciente em dentição mista. O exame clínico revela a presença dos incisivos centrais superiores decíduos e a presença dos incisivos laterais permanentes. Os incisivos centrais decíduos não apresentam nenhum grau de mobilidade. A paciente não apresenta diastemas entre os incisivos superiores. O exame físico extrabucal não apresenta particularidades. Não há histórico de trauma bucomaxilofacial associado à região.

- 
- 32.** Identifique e analise, pelo menos, dois pontos considerados importantes para a área da Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais, integrada ao Sistema Único de Saúde.  
Proponha estratégias na gestão do cuidado e um plano terapêutico, justificando a sua escolha.

01.	
02.	
03.	
04.	
05.	
06.	
07.	
08.	
09.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	