



COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - COREMU

PROCESSO SELETIVO 2022
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE

PERIODONTIA

INSTRUÇÕES

- Verifique se este **Caderno** corresponde ao Programa de Residência ao qual você se candidatou e se ele contém **trinta** questões objetivas (questões de 01 a 30) e **duas** questões dissertativas (questões 31 e 32). Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Você dispõe de quatro horas (4h) para realizar a prova, incluindo o tempo destinado ao preenchimento da folha de respostas das questões objetivas e à transcrição das questões dissertativas.
- Para cada **questão objetiva**, existe apenas **uma** alternativa correta.
- Ao transcrever suas respostas para a folha de respostas, faça-o com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o documento oficial do Concurso e não será substituída. Preencha completamente as elipses (●) na folha de respostas.
- Não assine nem coloque seu nome na Folha de Respostas Dissertativas. Assine no campo específico para tal fim (**parte destacável do rodapé da página**), atendendo, conforme Edital, ao procedimento de **desidentificação** das questões dissertativas.
- Qualquer identificação do candidato na Folha de Respostas Dissertativas, fora do espaço destacável, como o registro de nome ou do número de inscrição, implicará a anulação da resposta às questões dissertativas.
- Utilize caneta esferográfica de tinta azul ou preta para assinalar as respostas das questões objetivas na folha de respostas e para responder as questões dissertativas na Folha de Respostas Dissertativas.
- Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, revistas, folhetos, impressos de qualquer natureza ou anotações; nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou quaisquer equipamentos eletrônicos.
- Ao concluir, levante a mão e aguarde o fiscal. Os dois últimos candidatos deverão se retirar da sala de prova ao mesmo tempo.
- O candidato somente poderá se retirar da sala uma hora (1h) após o início da prova. Se quiser levar o Caderno de Questões, o candidato somente poderá se retirar da sala uma hora e meia (1h30min) após o início da prova. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.
- Os candidatos terão direito de permanecer na sala até que o último candidato conclua a prova, desde que permaneçam em silêncio.
- As folhas de respostas são a prova legal exclusiva de suas respostas. Devolva-as ao fiscal da sala, sob pena de exclusão do Concurso.

Nome do(a) candidato(a)

Número de inscrição

Comissão Permanente de Seleção – COPERSE

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.

01. Considere o conceito abaixo.

Organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e inter-dependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população – prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e com equidade – e com responsabilidades sanitária e econômica, gerando valor para a população.

Assinale a alternativa que representa corretamente o conceito.

- (A) Atenção primária à saúde.
- (B) Clínica ampliada em saúde.
- (C) Controle social em saúde.
- (D) Estratégia de saúde da família.
- (E) Rede de atenção à saúde.

02. Considere as afirmações abaixo, sobre a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS).

- I - A PNEPS assume a regionalização da gestão do SUS como base para desenvolver iniciativas de enfrentamento das carências e necessidades do sistema nacional de saúde; portanto, precisa ser pensada e adaptada às situações de saúde em cada nível local do sistema.
- II - A Educação Permanente em Saúde (EPS) configura-se como aprendizagem no trabalho, em que aprender e ensinar incorporam-se ao cotidiano dos serviços de saúde e do processo de trabalho.
- III- A PNEPS caracteriza-se como uma vertente educacional com potencialidades ligadas a mecanismos e temas que possibilitam gerar reflexão sobre o processo de trabalho, a autogestão, a mudança institucional e a transformação das práticas nos serviços, por meio da proposta do aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de construir cotidianos e eles mesmos se constituírem como objeto de aprendizagem individual, coletiva e institucional.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

03. Considere a afirmação abaixo.

A ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população são influenciados pelos aspectos sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais.

Assinale a alternativa que diz respeito a essa afirmação.

- (A) Determinantes sociais da saúde.
- (B) Epidemiologia.
- (C) Iniquidades em saúde.
- (D) Processo saúde-doença.
- (E) Saúde pública.

04. Considere as afirmações abaixo, sobre os elementos constitutivos da Rede de Atenção à Saúde.

- I - O primeiro elemento das redes de atenção à saúde e sua razão de ser é uma população, colocada sob sua responsabilidade sanitária e econômica. É isso que marca a atenção à saúde baseada na população, uma característica essencial das redes de atenção à saúde.
- II - O segundo elemento constitutivo é a responsabilidade fundamental da atenção primária pelo processo de territorialização; cadastramento das famílias; classificação das famílias por riscos socio sanitários; vinculação das famílias à unidade de atenção primária à saúde; identificação de subpopulações com fatores de riscos e com condições de saúde muito complexas.
- III- O terceiro elemento constitutivo das redes de atenção à saúde são os modelos de atenção à saúde, aqui entendidos como sistemas lógicos que organizam o funcionamento das redes de atenção à saúde, definidos em função da visão prevaiente da saúde, das situações demográfica e epidemiológica e dos determinantes sociais da saúde, vigentes em determinado tempo e em determinada sociedade. Há modelos de atenção à saúde para as condições agudas e crônicas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

05. Leia o que diz Rui Barbosa, em 1921, na Oração aos Moços.

"...A regra da igualdade não consiste senão em quinhão desigualmente aos desiguais, na medida em que se desiguam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo não dar a cada um na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos se equivalessem..."

Assinale a alternativa que indica corretamente o conceito em saúde, apresentado pelo texto.

- (A) Acolhimento.
- (B) Controle social.
- (C) Equidade.
- (D) Integralidade.
- (E) Universalidade.

06. Considere as afirmações abaixo, sobre o Sistema Único de Saúde, seus princípios e sua historicidade.

- I - O Sistema Único de Saúde (SUS) nasceu legitimamente de uma conquista popular, que foi desencadeada ainda na década de 70, em consonância com os ideais da Reforma Sanitária. Nesses 30 anos de criação do SUS, muitos foram os avanços, principalmente no que se refere aos princípios de universalidade e descentralização dos serviços.
- II - O SUS, apesar das dificuldades, tem permanecido como referência para outras democracias, promovendo orientação, prevenção, reabilitação e manutenção da saúde, cujo foco principal é o atendimento de forma universal, integral e com equidade em todos os níveis de atenção.
- III- A saúde coletiva é entendida como campo científico, onde se produzem saberes e conhecimentos acerca do objeto saúde e onde operam distintas disciplinas que o contemplam sob vários ângulos; e como prática social, onde se realizam ações em diferentes organizações e instituições por diversos agentes dentro e fora do espaço convencionalmente reconhecido como setor saúde. Assim, como campo de saber específico, a saúde coletiva acontece tanto no nível científico como no das práticas socio sanitárias.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

07. Assinale a alternativa correta sobre conceitos e definições em Epidemiologia.

- (A) A endemia diz respeito à frequência com que surgem novos casos de uma doença num intervalo de tempo, como se fosse um filme sobre a ocorrência da doença, no qual cada quadro pode conter um novo caso ou novos casos. É, assim, uma medida dinâmica.
- (B) A prevalência refere-se ao número de casos existentes de uma doença em um dado momento; é uma "fotografia" sobre a sua ocorrência, sendo assim uma medida estática. Os casos existentes são daqueles que adoeceram em algum momento do passado, somados aos casos novos dos que ainda estão vivos e doentes.
- (C) A letalidade é uma medida muito utilizada como indicador de saúde; é calculada dividindo o número de óbitos pela população em risco.
- (D) A mortalidade é uma medida da gravidade da doença, calculada dividindo o número de óbitos por determinada doença pelo número de casos da mesma doença. Algumas doenças apresentam mortalidade nula, como, por exemplo, escabiose; já para outras, a mortalidade é igual ou próxima de 100%, como a raiva humana.
- (E) A epidemia refere-se a uma doença habitualmente presente entre membros de um determinado grupo, dentro dos limites esperados, em uma determinada área geográfica, por um período de tempo ilimitado.

08. Considere as afirmações abaixo, sobre atribuições dos profissionais em atuação na Atenção Básica.

- I - Estabelecer, nos respectivos Planos Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde, prioridades, estratégias e metas para a organização da Atenção Básica.
- II - Garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando diversas racionalidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas e Complementares.
- III- Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado, realizando classificação de risco, identificando as necessidades de intervenções de cuidado, responsabilizando-se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

09. Leia o texto abaixo, sobre princípios e diretrizes da Atenção Básica, orientadores para sua organização nos municípios.

É o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, da redução de danos e dos cuidados paliativos. Inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento adequado das necessidades biológicas, psicológicas, ambientais e sociais causadoras das doenças, e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a esses fins, além da ampliação da autonomia das pessoas e coletividade.

Assinale a alternativa que diz respeito a esse texto.

- (A) Integralidade do cuidado.
- (B) Rede de atenção à saúde.
- (C) Regionalização e hierarquização.
- (D) Resolutividade do sistema.
- (E) Universalidade do acesso.

10. Leia o texto abaixo, sobre a Bioética em pesquisa com seres humanos.

Define a anuência do participante da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar.

Assinale a alternativa que diz respeito a esse texto.

- (A) Assentimento livre e esclarecido.
- (B) Assistência ao participante da pesquisa.
- (C) Consentimento livre e esclarecido.
- (D) Risco da pesquisa.
- (E) Sigilo e privacidade dos participantes.

11. Considere a situação abaixo.

Paciente com 49 anos de idade, do sexo masculino e sem doenças sistêmicas, apresenta periodontite, requerendo raspagem e alisamento radicular subgingival.

Sobre essa situação, considere as seguintes afirmações.

- I - A instrumentação deve ser realizada sob anestesia local.
- II - O instrumento manual para raspagem, cureta periodontal, deve ser segurado com a empunhadura modificada de caneta.
- III- O mapeamento de bolsa periodontal deve ser feito antes, durante e após a instrumentação subgingival.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

12. Assinale a alternativa correta sobre a organização das bactérias bucais em um biofilme dental bacteriano.

- (A) A existência de uma superfície sólida, na qual as bactérias possam aderir, não é essencial para a formação do biofilme.
- (B) A profundidade de sondagem não exerce nenhuma influência sobre a contagem média das bactérias subgingivais.
- (C) A sobrevivência do biofilme é possível, porque existe uma comunicação interna e eficiente entre as bactérias.
- (D) Os biofilmes são compostos de microcolônias bacterianas, distribuídas de maneira aleatória.
- (E) Os micro-organismos organizados em biofilme têm resistência à ação de antibióticos, a exemplo do que acontece quando crescem isoladamente.

13. A cureta indicada para raspagem subgingival de uma bolsa periodontal, na face mesial do dente 16, é a

- (A) Cureta McCall 13-14.
- (B) Cureta McCall 17-18.
- (C) Cureta Gracey 1-2.
- (D) Cureta Gracey 11-12.
- (E) Cureta Gracey 13-14.

14. Considere as afirmações abaixo, sobre pacientes diabéticos.

- I - Os pacientes diabéticos não controlados apresentam maior risco para desenvolvimento e progressão da periodontite.
- II - O tratamento periodontal deve ser baseado em uma atuação multidisciplinar, com instrução de higiene bucal para o paciente, raspagem supragengival e subgingival, e avaliação sistêmica.
- III- A cicatrização periodontal é mais lenta em pacientes diabéticos e não depende do controle glicêmico.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

15. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem em que aparecem.

O índice de placa visível permite a distinção de quantidade e localização do biofilme na área dentogengival. Já o índice de reflete a existência de um processo inflamatório ativo nos tecidos periodontais de proteção. Por sua vez, o exame de afere a distância da junção cimento-esmalte até a porção mais apical sondável do fundo de sulco/bolsa periodontal. É um dos exames essenciais para estabelecer o diagnóstico de

- (A) supragengival – sangramento gengival – perda de inserção – periodontite
- (B) supragengival – sangramento à sondagem – profundidade de sondagem – periodontite
- (C) subgengival – sangramento gengival – profundidade de sondagem – gengivite
- (D) subgengival – sangramento à sondagem – profundidade de sondagem – gengivite
- (E) subgengival – sangramento à sondagem – perda de inserção – periodontite

16. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () A presença de cálculo aumenta o risco para a progressão das doenças periodontais.
- () Um sítio pode apresentar a mesma profundidade de sondagem em dois exames subsequentes e, ainda assim, apresentar perda de inserção periodontal.
- () Todos os pacientes são igualmente suscetíveis à periodontite, se a higiene bucal for inadequada.
- () O estabelecimento do biofilme subgengival depende da presença de um biofilme supragengival pré-estabelecido.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V.
- (B) F – F – V – F.
- (C) F – F – F – V.
- (D) V – V – F – F.
- (E) V – F – V – V.

17. O sinal clínico para o diagnóstico da gengivite associada à placa bacteriana é

- (A) acúmulo de biofilme na região dentogengival.
- (B) sangramento da margem gengival.
- (C) presença de cálculo.
- (D) profundidade de sondagem.
- (E) perda óssea alveolar.

18. Considere as afirmações abaixo, sobre a anatomia do periodonto.

- I - A ranhura gengival livre posiciona-se a um nível correspondente à junção cimento-esmalte, em indivíduos nunca acometidos pela doença periodontal destrutiva.
- II - A estrutura que adere ao dente por hemidesmossomos e que promove o selamento marginal do periodonto de inserção denomina-se inserção conjuntiva.
- III- O epitélio juncional e o ligamento supracrestal compõem os tecidos de inserção supracrestais.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

19. Considere as afirmações abaixo, sobre o emprego de antibióticos na terapia periodontal.

- I - Os antibióticos sistêmicos devem ser prescritos no tratamento de todos os processos agudos periodontais.
- II - O uso desses fármacos em Periodontia não apresenta reações adversas e não eleva o risco de desenvolvimento de resistência bacteriana.
- III- O uso de antibióticos fracassa, se não estiver associado à remoção mecânica do biofilme dentário.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

20. Na coluna da esquerda, estão listados materiais usados em periodontia, na da direita, sua finalidade. Associe adequadamente a coluna da direita à da esquerda.

- 1 - Escova unitufo.
- 2 - Escova interdental.
- 3 - Fio dental.
- 4 - Dentifrícios.
- 5 - Pastas profiláticas.

- () Dispositivo utilizado para controle mecânico do biofilme supragengival em áreas com ponto de contato e papila gengival preenchendo totalmente o espaço interdental.
- () Dispositivo utilizado para controle mecânico do biofilme supragengival em áreas onde o tecido gengival não preenche totalmente a ameia interproximal.
- () Dispositivo utilizado para controle mecânico do biofilme supragengival em regiões de difícil acesso, áreas de apinhamento dental, recessões gengivais, e áreas de furca.
- () Substâncias que auxiliam na limpeza e polimento das superfícies dentais, e que podem apresentar propriedade antibacteriana e anticálcio em seus compostos ativos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 3 – 1 – 5.
- (B) 2 – 1 – 3 – 5.
- (C) 2 – 3 – 1 – 4.
- (D) 3 – 2 – 1 – 4.
- (E) 3 – 1 – 2 – 5.

21. Considere as afirmações abaixo, em relação à etiopatogenia das doenças periodontais.

- I - A destruição contínua de colágeno e a migração apical do epitélio juncional caracterizam reações inflamatórias que marcam, histologicamente, a transição da gengivite para a periodontite.
- II - As bactérias, organizadas em um biofilme subgengival, contribuem para o dano dos tecidos periodontais em função da liberação de substâncias nocivas e da resposta imunoinflamatória, obtida por meio de fatores de virulência.
- III- Os tecidos gengivais são clinicamente saudáveis quando apresentam ausência de vasodilatação, de permeabilidade vascular e de liberação de fluido crevicular gengival.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.


22. Considere as afirmações abaixo, sobre a epidemiologia da gengivite.

- I - Os estudos epidemiológicos com amostras representativas têm demonstrado que a gengivite é altamente prevalente na população brasileira e mundial.
- II - O número de sítios acometidos pela gengivite nos indivíduos varia pouco entre as populações; a maioria dos indivíduos apresenta muitos sítios acometidos pela doença.
- III- A gengivite é um quadro inflamatório prioritário em saúde coletiva, pois leva à periodontite em todos os indivíduos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

23. Observe a figura abaixo, sobre os sinais clínicos observados após a terapia periodontal não cirúrgica.



Com base na figura acima, assinale a alternativa correta.

- (A) Ocorre ganho de inserção clínica por reparo ósseo.
- (B) Há redução do edema marginal, o que não contribui para a redução da profundidade de sondagem.
- (C) Há redução da profundidade de sondagem, o que está diretamente e proporcionalmente relacionado à recessão gengival.
- (D) É maior a recessão gengival quanto menor for a profundidade de sondagem inicial, devido ao trauma da instrumentação.
- (E) Ocorre ganho de inserção à sondagem, devido à resolução do processo inflamatório e à formação de um epitélio juncional longo.

24. De acordo com a Nova Classificação das Doenças Periodontais e Peri-implantares, o diagnóstico de peri-implantite deve ser realizado por meio do

- (A) exame radiográfico periapical e análise do volume do fluido crevicular gengival.
- (B) grau de mobilidade do implante.
- (C) exame físico de profundidade de sondagem e sangramento à sondagem, e exame radiográfico periapical.
- (D) exame físico de perda de inserção clínica e exame radiográfico periapical.
- (E) exame radiográfico periapical.

25. Considere as afirmações abaixo, sobre a reavaliação periodontal.

- I - A cicatrização periodontal leva no máximo 30 dias para ser finalizada, quando, então, pode-se realizar a reavaliação do tratamento periodontal.
- II - O tempo necessário para a cicatrização periodontal é maior para pacientes fumantes.
- III- Os sítios que permanecerem com valores de profundidade de sondagem maiores de 4 mm devem ser considerados bolsas periodontais não respondentes ao tratamento.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

26. Considere as afirmações abaixo, sobre os processos agudos do periodonto.

- I - O estresse é um fator sistêmico relacionado à etiologia das doenças periodontais necrosantes.
- II - A pericoronarite refere-se a processo inflamatório agudo, localizado nos tecidos gengivais que recobrem dentes parcialmente erupcionados.
- III- Os abscessos gengivais ocorrem normalmente em sítios previamente saudáveis e por impactação de corpo estranho.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

27. Considere a situação abaixo.

Um paciente apresenta, na face mesial do dente 36, uma distância da junção cimento-esmalte à porção mais apicalmente sondável do fundo de sulco/bolsa periodontal de 8 mm; apresenta também uma distância da margem gengival à porção mais apicalmente sondável do fundo de sulco/bolsa periodontal de 5 mm.

Sobre essa situação, considere as afirmações a seguir.

- I - Há, na face mesial, uma profundidade de sondagem de 5 mm.
- II - Há uma perda de inserção de 8 mm.
- III- Existe uma recessão gengival de 12 mm.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

28. Considere as afirmações abaixo, sobre a relação entre fumo e doenças periodontais.

- I - Os pacientes fumantes apresentam, clinicamente, mascaramento do sangramento da margem gengival.
- II - A identificação do fumo como fator de risco foi feita em estudos longitudinais em diferentes populações.
- III- Uma relação dose-resposta existe entre fumo e periodontite, em que indivíduos fumantes pesados apresentam maior risco de desenvolvimento e progressão da periodontite.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

29. Considere as afirmações abaixo, em relação ao diagnóstico das doenças periodontais, de acordo com a Nova Classificação das Doenças Periodontais e Peri-implantares.

- I - As periodontites podem ser classificadas em estágio e severidade.
- II - A perda de inserção clínica interproximal no pior sítio é o principal critério de diagnóstico, juntamente com o número de dentes perdidos.
- III- A profundidade de sondagem determina a complexidade do tratamento, mas não o grau da doença.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

30. Considere as afirmações abaixo, sobre a manutenção periódica preventiva.

- I - A frequência das consultas de manutenção deve ser estabelecida individualmente para cada paciente.
- II - A perda dentária, de acordo com a literatura, é maior em pacientes que não realizam a manutenção após o tratamento periodontal.
- III- Um dos principais objetivos da manutenção é monitorar o controle do biofilme supragengival pelos pacientes, visto que o sucesso longitudinal da terapia periodontal depende da capacidade do paciente em manter uma boa higiene bucal.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

Instrução das questões de caráter dissertativo:

O texto final de cada uma de suas respostas deve

- ter extensão mínima de 15 linhas (aquém disso, sua resposta não será avaliada) e máxima de 30 linhas. Segmentos emendados, ou rasurados, ou repetidos, ou linhas em branco terão esses espaços descontados do cômputo total de linhas;
- ser escrito com caneta esferográfica azul e com letra legível, de tamanho regular, na folha própria para respostas.

Instrução: A questão **31** deve ser respondida com base na situação 1 abaixo.

Situação 1

O estudo epidemiológico realizado por Carvajal *et al.*, em 2016, encontrou uma prevalência de representativa de indivíduos adultos de Porto Alegre. Além disso, os dados apontaram alguns fatores identificados como indicadores de risco ao desenvolvimento da inflamação gengival, como o sexo feminino, a quantidade de cálculo supragengival e 30% ou mais dos sítios dentários com a presença de biofilme supragengival visível.

(Fonte: Carvajal *et al.* Prevalence, severity, and risk indicators of gingival inflammation in a multi-center study on South American adults: a cross sectional study. *J Appl Oral Sci.* 2016;24(5):524-534. doi:10.1590/1678-775720160178)

31. Com base nesses dados, explique como os indicadores de risco encontrados podem estar biologicamente envolvidos com a gengivite, e disserte sobre como tais informações epidemiológicas podem ser usadas no contexto da organização da atenção periodontal, na atenção primária.

01.	
02.	
03.	
04.	
05.	
06.	
07.	
08.	
09.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	

Instrução: A questão **32** deve ser respondida com base na situação 2 abaixo.

Situação 2

A partir dos dados do último levantamento nacional de saúde bucal, o SB Brasil 2010, pode-se observar um aumento da prevalência de periodontite, da faixa etária de 15 a 19 anos para a faixa etária de 35 a 44 anos, determinada pela presença de bolsas rasas e profundas e medida pelo Índice Comunitário Periodontal. Já a faixa etária seguinte, de indivíduos de 64 a 74 anos, apresenta uma drástica diminuição dessa prevalência.

32. Reflita sobre as informações epidemiológicas apresentadas e disserte sobre os possíveis motivos relacionados à diminuição da prevalência da periodontite nos indivíduos idosos do Brasil, e sobre como esse cenário pode ser modificado pela atuação de um cirurgião-dentista periodontista no Sistema Único de Saúde.

01.	
02.	
03.	
04.	
05.	
06.	
07.	
08.	
09.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	