

**וואקסין אינפארמאציע סטייטמענט**

Many Vaccine Information Statements are available in Yiddish and other languages. See [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)

פיל וואקסין אינפארמאציע סטייטמענטס זענען אוועלעבל אין אידיש און אנדערע שפראכן. [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis) UVI

**וועריסעלא (טשיקענפאקס) וואקסין:  
וואס איר דארפט וויסן**

**1. פארוואס צו וואקסינירט ווערן?**

די וועריסעלא וואקסין קען פארמיידן וועריסעלא.

וועריסעלא אדער "טשיקענפאקס" פאראורזאכט א קראצעדיגע אויסשלאג וואס בלייבט געווענטליך פאר בערך א וואך. עס קען אויך פאראורזאכן פיבער, פילן אויסגעמוטשעט, פארלירן דעם אפעטיט און קאפוויי. עס קען פירן צו הויט אינפעקציעס, לונגען אנטציינדונג (ניומאָניע), אנטציינדונג פון די בלוט אדערן, א געשווילעכץ פון די הייטל פון די מוח און/אדער חוט השדרה און אינפעקציעס אין די בלוט שטרוים, אין די ביין אדער דזשוינטס (געלענקן). טייל מענטשן וואס באקומען טשיקענפאקס באקומען א ווייטאגליכע אויסשלאג וואס הייסט "שינגלס" (אויך גערופן הערפּיס זאָסטער) יארן שפעטער.

טשיקענפאקס איז געווענטליך מילד, אבער עס קען זיין ערנסט אין בייביס אונטער 12 חודשים, עלטערע קינדער, דערוואקסענע, טראגעדיגע מענטשן און מענטשן מיטן אן אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם. טייל מענטשן קענען ווערן אזוי קראנק אז זיי דארפן האספיטאליזירט ווערן. עס געשעט נישט אפט, אבער מענטשן קענען רח"ל שטארבן פון טשיקענפאקס.

די מערהייט פון מענטשן וואס זענען וואקסינירט מיט 2 דאזעס פון דעם וועריסעלא וואקסין וועלן זיין באשיצט פאר זיין גאנצן לעבן.

**2. וועריסעלא וואקסין**

קינדער דארפן 2 דאזעס פון דעם וועריסעלא וואקסין, געווענטליך:

- ערשטע דאזע: פון 12 ביז 15 חודשים
- צווייטע דאזע: פון 4 ביז 6 יאר

עלטערע קינדער, צענערלינגען און דערוואקסענע דארפן אויך באקומען 2 דאזעס פון דעם וועריסעלא וואקסין אויב זיי זענען נאכנישט אימיון צו טשיקענפאקס.

דער וועריסעלא וואקסין קען געגעבן ווערן אין דעם זעלבן צייט ווי אנדערע וואקסינען. א קינד צווישן 12 חודשים און 12 יאר אלט וועט אויך מעגליך באקומען דעם וועריסעלא וואקסין צוזאמען מיט דעם MMR (מיזלס, מאָמפּס און רובעלא/measles, mumps, and rubella) וואקסין אין איין איינשפריץ, גערופן MMRV. אייער דאקטאר קען אייך גיבן מער אינפארמאציע.

**3. רעדט מיט אייער דאקטאר**

זאגט דעם צושטעלער פון וואקסין אויב דער מענטש וואס באקומט דעם וואקסין:

- האט געהאט אן אלערגישע רעאקציע נאך א פריערדיגע דאזע פונעם וועריסעלא וואקסין, אדער האט סיי וועלכע ערנסטע, לעבנס-סכנות'דיגע אלערגיעס
- איז טראגעדיג אדער טראכט אז זיי זענען מעגליך טראגעדיג — טראגעדיגע מענטשן זאלן נישט באקומען דעם וועריסעלא וואקסין
- האט אן אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם אדער האט א טאטע/מאמע אדער ברודער/שוועסטער מיט א געשיכטע פון געירשנ'טע אדער געבוירענע אימיון סיסטעם פראבלעמען
- נעמט איין salicylates מעדיצינען (צום ביישפיל אספירין)
- האט לעצטנס געהאט אן IV בלוט טרענספיוזשען אדער לעצטנס באקומען אנדערע בלוט מאטעריאלן
- האט געהאט טובערקולאזיס
- האט באקומען סיי וועלכער אנדערער וואקסין אין די פארגאנגענע 4 וואכן

אין געוויסע פעלער, וועט אייער דאקטאר מעגליך באשלוסן צו אפשטופן וועריסעלא וואקסינאציע ביז א צוקונפטדיגע באזוך.

מענטשן וואס פילן זיך מילד נישט גוט, ווי צום ביישפיל א פארקילעכץ, קענען וואקסינירט ווערן. מענטשן וואס זענען מיטלמעסיג אדער ערנסט קראנק זאלן געווענטליך ווארטן ביז זיי דערהוילן זיך איידער באקומען דעם וועריסעלא וואקסין.

אייער דאקטאר קען אייך גיבן מער אינפארמאציע.



U.S. Department of Health and Human Services  
Centers for Disease Control and Prevention

## 4. סכנות פון א רעאקציע צום וואקסין

- ווייטאג אין די ארעם פון די איינשפרייז, רויטליכקייט אדער אן אויסשלאג אויף דעם פלאץ וואו מען האט געגעבן די איינשפרייז אדער א פיבער קענען געשען נאכן באקומען דעם וועריסעלא וואקסין.
- ערנסטערע רעאקציעס געשען זייער זעלטן. ערנסטערע רעאקציעס קענען אריינרעכענען לונגען אנטצינדונג (ניומאָניע), אן אינפעקציע פון די הייטל ארום די מוח און/אדער חוט השדרה אדער סוזשערס וועלכע קומען אפט מיט פיבער.
- אין מענטשן מיט ערנסטע אימיון סיסטעם פראבלעמען די וואקסין קען פאראורזאכן אן אינפעקציע וואס קען זיין א סכנה פארן לעבן. מענטשן מיט ערנסטע אימיון סיסטעם פראבלעמען דארפן נישט באקומען דעם וועריסעלא וואקסין.

עס איז מעגליך פאר א וואקסיןירטער מענטש צו באקומען אן אויסשלאג. אויב דאס געשעט, דעם וועריסעלא וואקסין ווירוס קען זיך פארשפרייטן צו אן אומבאשיצטער מענטש. א מענטש וואס באקומט אן אויסשלאג זאל אוועקשטיין פון בייביס און פון מענטשן מיט אן אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם ביז די אויסשלאג גייט אוועק. רעדט מיט אייער דאקטאר צו לערנען מער.

טייל מענטשן וואס ווערן וואקסיןירט קעגן טשיקענפאקס באקומען שינגלס (הערפּיס זאָסטער) יארן שפעטער. עס איז אבער פיל מער זעלטן נאך א וואקסיןאציע ווי נאכן עכט זיין קראנק מיט טשיקענפאקס.

מענטשן חלש'ן צומאל נאך מעדיצינישע פראצעדורן, אריינרעכענענדיג וואקסיןאציע. זאגט אייער דאקטאר אויב איר באקומט א שווינדל אדער אויב אייער זעענונג טוישט זיך אדער אויב איר הערט קלינגען אין די אויערן.

פונקט ווי מיט סיי וועלכע מעדיצין, עס זענען דא גאר קליינע אויסזיכטן אז א וואקסין זאל פאראורזאכן א שווערע אלערגישע רעאקציע, אן אנדערע ערנסטע שעדיגונג, אדער טויט.

## 5. וואס אויב עס איז דא אן ערנסטן פראבלעם?

אן אלערגישע רעאקציע קען פארקומען נאכדעם וואס דער מענטש וואס האט באקומט דעם וואקסין פארלאזט די קלייניק. אויב איר זעט סימנים פון אן ערנסטע אלערגישע רעאקציע (אויסשלאגן, אן אויפגעשוואלענע פנים און האלז, שוועריקייטן צו אטעמען, א שנעלע הארץ קלאפ, א שווינדל אדער שוואכקייט), רופט 1-1-9 און נעמט דעם מענטש צו דעם נאענסטן שפיטאל.

פאר אנדערע סימנים וואס באזארגן אייך רופט אייער דאקטאר.

אומגעוואונטשענע רעאקציעס זאלן באריכטעט ווערן צו דעם (VAERS) Vaccine Adverse Event Reporting System (וואקסין אומגעוואונטשענע אינצידענטן באריכטונג סיסטעם). אייער דאקטאר וועט געווענטליך זיין דער וואס וועט אריינגעבן דעם באריכט, אדער איר קענט דאס אליין טאן. באזוכט די VAERS וועבזייטל אויף [www.vaers.hhs.gov](http://www.vaers.hhs.gov) אדער רופט 1-800-822-7967 "אין" XCGTU "איז" געווידמעט "נאר" צו "באריכטן" רעאקציעס, און "אין" XCGTU "שטאב" מיטגלידער "גיבן" נישט "קיינע" מעדיצינישע עצות.

## 6. דער נאציאנאלע וואקסין שאדן פארגוטיונג פראגראם

דער National Vaccine Injury Compensation Program (VICIP) (נאציאנאלע וואקסין שאדן פארגוטיונג פראגראם) איז א פעדעראלער פראגראם וואס איז אוועקגעשטעלט געווארן צו פארגוטיונג מענטשן וואס זענען מעגליך געשעדיגט געווארן דורך געוויסע וואקסיןען. קליימס אין פארבינדונג מיט אנגעבליכע שאדן אדער טויט צוליב א וואקסיןאציע האבן א באגרעניצטע צייט צו אריינגעגעבן ווערן - קענענדיג זיין אזוי קורץ ווי צוויי יאר. באזוכט די VICIP וועבזייטל אויף [www.hrsa.gov/vaccinecompensation](http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation) אדער רופט 1-800-338-2382 צו לערנען מער איבער דעם פראגראם און איבער ווי אזוי אריינצוגעבן א קליימס.

## 7. ווי אזוי קען איך לערנען מער?

- פרעגט אייער דאקטאר.
- רופט אייער לאקאלע אדער סטייט העלט דעפארטמענט.
- באזוכט די וועבזייטל פון די Food and Drug Administration (FDA) (עסן און דראג אדמיניסטראציע) פאר די אינפארמאציע צעטלעך וואס קומען מיט די וואקסין פעקלעך און פאר נאך אינפארמאציע אויף [www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines](http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines)
- פארבינדט זיך מיט די Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (צענטערס פאר קראנקייט קאנטראל און פארמיידונג): רופט 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) אדער באזוכט די CDC וועבזייטל אויף [www.cdc.gov/vaccines](http://www.cdc.gov/vaccines)

Yiddish translation provided by Immunize.org

